

BIALCOL MED*soluz cutanea 300 ml 1 mg/ml

Marchio: BIALCOL
Codice Min.: 032186013
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE BIALCOL MED 1 MG/ML SOLUZIONE CUTANEA
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Antisettici e disinfettanti - derivati ammonici quaternari.
PRINCIPI ATTIVI BIALCOL MED 1 mg/ml soluzione cutanea: 100 ml di soluzione contengono principio attivo: benzoxonio cloruro 100 mg. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
ECCIPIENTI Alcool isopropilico; acetone; etile acetato; acido acetico glaciale; pino essenza; etere dietilenico monoetiletere; ottilfenolo etossilato; sodio idrossido; acqua depurata.
INDICAZIONI Antisepsi e disinfezione della cute in caso di escoriazioni e di ferite superficiali di estensione limitata.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI Ipersensibilita' al principio attivo benzoxonio cloruro o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o

ad altri composti ammonici quaternari; non usare su cute gravemente lesa; non usare nel meato acustico esterno; non usare per la disinfezione delle mucose; non impiegare in cavita' corporee o per enteroclisma; non usare per la disinfezione delle lenti a contatto morbide.
POSOLOGIA Posologia: per uso cutaneo. Modo di somministrazione: applicare localmente una piccola quantita', direttamente o usando una garza sterile/cotone, assicurandosi che il liquido non si accumuli nelle pieghe cutanee del paziente, dopo aver pulito la zona interessata con acqua calda e aver asciugato toccando leggermente con un panno morbido. Ripetere l'applicazione 4-5 volte al giorno o secondo necessita'. Non superare le dosi raccomandate e usare solo per brevi periodi di trattamento (3 giorni).
CONSERVAZIONE Tenere il flacone ben chiuso; questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.
AVVERTENZE Solo per uso esterno; non deve essere ingerito. Evitare il contatto con gli occhi, le orecchie (canale uditivo), le membrane mucose (come bocca e naso) e le ferite profonde. In caso di contatto accidentale sciacquare bene con abbondante quantita' d'acqua. Non deve essere utilizzato in cavita' del corpo o per clisteri. Se i sintomi persistono o la condizione peggiora (la ferita e' gonfia, dolente o accompagnata da febbre) o se si verifica una reazione cutanea, interrompere l'uso e consultare il medico. Non utilizzarlo frequentemente o per un lungo periodo di tempo senza consultare il medico. Non applicare sul seno durante l'allattamento al seno.
INTERAZIONI Non sono stati effettuati studi di interazione. Tuttavia il potenziale di interazione con medicinali e' considerato basso in quanto il benzoxonio cloruro e' scarsamente assorbito dopo applicazione topica. Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici o detergenti.
EFFETTI INDESIDERATI Riassunto del profilo di sicurezza: in rari casi, puo' verificarsi irritazione cutanea che non ha conseguenze e che non richiede una modifica del trattamento. L'applicazione prolungata e ripetuta del prodotto sulla pelle non e' raccomandata in quanto si puo' verificare orticaria, angioedema e reazioni anafilattiche. Elenco delle reazioni avverse: le reazioni avverse sono elencate di seguito mediante la classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le

frequenze sono definite come: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$ a = $1/1.000$ a = $1/10.000$ a

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Gravidanza: non ci sono adeguati dati sull'uso di benzoxonio cloruro in donne gravide/in gravidanza. Studi di tossicit  fetale negli animali suggeriscono nessun effetto avverso (vedi paragrafo 5.3). I potenziali rischi per l'uomo non sono noti ma sono probabilmente molto bassi in quanto il benzoxonio cloruro   scarsamente assorbito dopo applicazione topica (vedi paragrafo 5.2). BIALCOL MED puo' essere utilizzato durante la gravidanza in piccole quantit  (su piccole ferite). Allattamento: non   noto se il benzoxonio cloruro sia escreto nel latte materno. Tuttavia   improbabile che il benzoxonio cloruro possa essere presente nel latte materno in quantit  clinicamente significative, poich  il prodotto   scarsamente assorbito dopo applicazione topica. BIALCOL MED puo' essere utilizzato durante l'allattamento al seno in piccole quantit  (su piccole ferite) eccetto che sui seni. I neonati non devono venire in contatto con la pelle trattata. Fertilit : nessun effetto del benzoxonio cloruro sulla fertilit    stato visto in studi negli animali (vedi paragrafo 5.3).