

BREVILIPID PLUS 30 COMPRESSE RIVESTITE

Marchio: BREVILIPID
Codice Min.: 974001303
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BreviLipid PLUS Integratore alimentare a base di Monacolina K da Riso rosso fermentato, Berberina, Coenzima Q10, Astaxantina e Acido Folico. Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue, al normale metabolismo dell'omocisteina. Regola la funzionalità dell'apparato cardiovascolare e contribuisce alla funzionalità epatica. Ingredienti Berberina cloridrato estratto secco titolato 97% (Berberis aristata dc, radici); agente di carica: fosfato di calcio; riso rosso fermentato (da Monascus purpureus Went.) estratto secco titolato 5% monacolina K (supporto: maltodestrine); stabilizzante: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, mono e digliceridi degli

acidi grassi; astaxantina (supporti: gelatina, amido di mais, saccarosio, acqua, ascorbil palmitato, tocoferoli); agenti antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, biossido di silicio; agenti di rivestimento: E904, E1201, E472A, E464, E460, E570; coenzima Q10; acido folico (acido pteroilmonoglutammico). Informazioni nutrizionali per compressa Riso rosso fermentato di cui Monacolina K 200 mg 10 mg Berberina cloridrato 500 mg Coenzima Q10 2 mg Astaxantina 0,5 mg Acido folico 100 mcg (50% VNR*) *VNR=Valori Nutritivi di Riferimento. Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno. Per l'assunzione deglutire la compressa con acqua. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Il trattamento con statine è ben tollerato dalla maggior parte delle persone. In alcuni casi, tuttavia, potrebbero presentarsi nausea, dolori muscolari, stipsi o diarrea. Tale effetti collaterali sono generalmente transitori. In caso di insorgenza di effetti collaterali, si consiglia di consultare il medico. Non usare in gravidanza, durante l'allattamento o in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti. Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di luce e di calore. Validità a confezione integra: 24 mesi. Formato Blister da 30 compresse rivestite.