

CERULISINA DOLORE* gocce auricolari 6 g 5% + 1%

Marchio: CERULISINA
Codice Min.: 027872011
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONECERULISINA DOLORE, 1% + 5% GOCCE AURICOLARI, SOLUZIONE FLACONE 6
GCATEGORIA FARMACOTERAPEUTICAAltri otologici, analgesici ed anestetici, associazioni.**PRINCIPI**
ATTIVI100 g contengono: procaina cloridrato 1 g (pari a procaina base 0,866g), fenazone 5
g.**ECCIPIENTI**Glicerolo.**INDICAZIONI**Otalgie.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita'
verso i componenti del prodotto e verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico;
in caso di perforazione del timpano, astenersi dall'uso. Il prodotto, a contatto con la struttura dell'orecchio
medio, puo' determinare effetti indesiderati a tale livello.**POSOLOGIA**Instillare nel condotto uditivo
esterno 2-4 volte al giorno. Adulti: 5-8 gocce ogni volta. Bambini: 4-5 gocce ogni volta. Si consiglia di
intiepidire il flacone prima dell'uso.**CONSERVAZIONE**Nessuna speciale precauzione per la
conservazione.**AVVERTENZE**Quale misura precauzionale, prima di somministrare il prodotto,
assicurarsi della integrita' della membrana del timpano. I prodotti per applicazione topica possono dare
origine a fenomeni di sensibilizzazione od irritazione: in tal caso interrompere il trattamento e consultare
il medico al fine di istituire idonea terapia. Non usare per trattamenti protratti, in ogni caso, dopo breve
periodo di trattamento (1-2 giorni) senza risultati apprezzabili, consultare il
medico.**INTERAZIONI**Nessuna nota.**EFFETTI INDESIDERATI**In caso di perforazione del timpano, il
prodotto, a contatto con la struttura dell'orecchio medio, puo' determinare effetti indesiderati a tale livello.
L'uso di fenazone, sia pure per via sistemica, e' stato associato ad un elevato rischio di agranulocitosi;
questo farmaco, cosi' come la procaina, puo' dare reazioni allergiche in soggetti sensibilizzati e, in
seguito ad assorbimento sistemico, anche manifestazioni anafilattiche. Segnalare qualsiasi reazione
avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**In
gravidenza, durante l'allattamento al seno e nella primissima infanzia, il farmaco deve essere utilizzato
solo in caso di effettiva necessita' e non per periodi prolungati.