

## CISTIDIL\*30 cpr 500 mg

**Marchio:** IDI  
**Codice Min.:** 025733015  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** CISTIDIL **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Dermatologici. **PRINCIPI ATTIVI** Levo-cistina 500,000 mg. **ECCIPIENTI** amido di riso FU VIII 85,00 mg; lattosio FU VIII 25,00 mg; polietilenglicol 6000 FU VIII 20,00 mg; carbossimetilamido sale sodico USP 15,00mg; magnesio stearato FU VIII 5,00 mg. **INDICAZIONI** Come coadiuvante nella terapia dell'acne, delle dermatiti atrofiche e nella psoriasi. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Cistinuria con calcolosi renale, sensibilità individuale accertata ai componenti. **POSOLOGIA** Da 2 a 4 compresse per via

orale durante i pasti per 2 o 3 cicli mensili. Le compresse possono essere deglutite intere o spezzate; meglio sedurante i pasti, oppure masticate dai soggetti con particolare sensibilità gastrica. **CONSERVAZIONE** Nessuna speciale precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** Nessuna. **INTERAZIONI** Nessuna interazione. **EFFETTI INDESIDERATI** L'assunzione non presenta effetti collaterali indesiderati. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** La cistina non ha effetto teratogeno.