

## CISTIQUER 30 COMPRESSE

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 932718354  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



CISTIQUER Integratore alimentare a base di elementi naturali, contribuisce a preservare l'integrità dell'epitelio vescicale e del tessuto connettivo, utile per il benessere delle vie urinarie. Quercetina Flavonoide polifenolico presente in varie piante e semi, svolge azione antiossidante; inibisce la secrezione di istamina, triptasi ed interleuchine da parte dei mastociti. Funge quindi da stabilizzatore delle membrane cellulari, che divengono meno sensibili agli allergeni. Bromelina Aiuta a diminuire l'infiammazione e l'edema. Centella Favorisce la corretta circolazione periferica, preservando il tono e la struttura delle pareti vasali. Rodiola e la Scutellaria Migliorano la concentrazione, il tono dell'umore e la memoria, riducono lo stress attraverso l'azione su alcuni mediatori cerebrali.

Glucosamina Ostacola il deterioramento del tessuto connettivo, ha funzione immunomodulatrice, ed è particolarmente usata nella riparazione del connettivo articolare. Condriotin Solfato È un glicosaminoglicano (GAG) solfato che si ritiene agisca sulla inibizione della sintesi del Nitrossido di Azoto, risultando così rapidamente efficace sui sintomi dati dalle infiammazioni. Ialuronato di sodio Ha un'azione sinergica con la quercetina, si è potuto rilevare un assorbimento con l'assunzione orale ed una distribuzione ai tessuti, è necessario per la salute dell'organismo, mantiene l'elasticità dei tessuti e ha effetto riepitelizzante sulla mucosa. La sua naturale concentrazione nell'organismo cala con l'invecchiamento (fatta 100 la sua percentuale presente nell'organismo a 20 anni, il valore decade a 65-45-e 25 rispettivamente a 30, 50 e 60 anni). Contiene inoltre cimicifuga, borosmo e calcio citrato. Non contiene glutine. Ingredienti Quercetina; bromelina; centella; rodiola; scutellaria; cimicifuga; borosmo glucosamina solfato; condroitin solfato; ialuronato di sodio; calcio citrato. Modalità d'uso Assumere due compresse al giorno, lontano dai pasti. Avvertenze Non superare le quantità di assunzione indicate. Per l'uso del prodotto e per la durata della sua assunzione si consiglia di consultare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato in disfunzioni o malattie epatiche. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non assumere in gravidanza o allattamento. Per i bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Formato Confezione da 30 compresse da 1.300 mg. Bibliografia - T.C. Theoharides and G.R. Sant: a pilot open label study of cystoprotek in interstitial cystitis. international journal of immunopathology and pharmacology vol. 18, no. 1, 183-188 (2005). - Daniel A. Shoskes, Scott I. Zeitlin, asha shahed, and jacob rajfer quercetin in men with category iii chronic prostatitis: a preliminary prospective, double-blind, placebo-controlled trial. urology 54: 960- 963, 1999. - D.Porru and M. Cervigni: ic/bps:still a hole in the air or a complex general syndrome, lap lambert academic publishing, july 2012.