

DAFLON*30 cpr riv 500 mg

Marchio: DAFLON
Codice Min.: 023356025
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE DAFLON 500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Vasoprotettore e venotonico. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni compressa rivestita con film contiene 500 mg di frazione flavonoica purificata micronizzata costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg diflavonoidi espressi in esperidina. **ECCIPIENTI** Carbosimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E 172, titanio diossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco. **INDICAZIONI** Sintomi attribuibili a insufficienza venosa; stati di fra g i l i t a '

capillare. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** 2 compresse rivestite con film al giorno (1 a mezzogiorno e 1 alla sera) al momento dei pasti, anche nell'insufficienza venosa del plesso emorroidario. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione. **AVVERTENZE** Nessuna. **INTERAZIONI** Non sono stati effettuati studi di interazione. Finora non e' stata segnalata alcuna interazione farmacologica clinicamente rilevante dall'esperienza post marketing sul prodotto. **EFFETTI INDESIDERATI** I seguenti effetti o reazioni avverse sono stati riportati e sono stati classificati secondo la seguente frequenza: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$, $= 1/1.000$, $= 1/10.000$, **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Gravidanza. I dati relativi all'uso di frazione flavonoica purificata micronizzata in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non indicano tossicitá riproduttiva. **Ascopo precauzionale**, e' preferibile evitare l'uso di Daflon durante la gravidanza. **Allattamento**. Non e' noto se il principio attivo/metaboliti siano escreti nel latte materno. Il rischio per i neonati/lattanti non puo' essere escluso. Deve essere presa la decisione se interrompere l'allattamento con latte materno o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con Daflon tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento con latte materno per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. **Fertilita'**. Studi di tossicitá riproduttiva non hanno mostrato effetti sulla fertilita' nei ratti ne' maschi ne' femmine.