

DIOSMECTALGO 12 BUSTINE

Marchio: IPSEN
Codice Min.: 979331182
Link: [clicca qui per acquistare](#)



diosmectalGo Descrizione Dispositivo medico, sospensione pronta da bere, in bustine monodose per somministrazione orale. DiosmectalGo è indicato per: -il trattamento della diarrea acuta in adulti e bambini di età superiore ad 8 anni. Il trattamento della somministrazione di soluzioni reidratanti orali per evitare la disidratazione; -il trattamento della diarrea cronica o del dolore addominale negli adulti. Il componente principale di DiosmectalGo è diosmectite. Diosmectite è un'argilla naturale che aiuta a bloccare e a trattare la diarrea e ad alleviare il dolore addominale. È stato dimostrato che: -si lega a tossine e germi (batteri e virus) ed aiuta ad eliminarli dal corpo; -protegge il tratto intestinale ed aiuta a riparare il danno intestinale grazie alle sue naturali proprietà di rivestimento. Ingredienti Diosmectite, gusto caramello cacao (miscela di aromi naturali e sintetici, colorante caramello

E150d, sciroppo di zucchero caramellato, glicole propilenico E1520, acqua, etanolo, caffeina), gomma di xantano, acido citrico monoidrato, acido ascorbico, sorbato di potassio, sucralosio, acqua purificata. Modalità d'uso Questo dispositivo medico va assunto per via orale ed è pronto da bere. Il contenuto della bustina può essere ingerito direttamente. Massaggiare la bustina prima di aprirla. Ogni bustina deve essere utilizzata una volta sola dopo averla aperta. - In caso di diarrea acuta -Bambini (8-15 anni inclusi): 2 bustine per iniziare, seguite da 1 bustina ogni evacuazione molle, fino a 4 bustine al giorno. Una soluzione reidratante orale (ORS) deve essere presa per reintegrare liquidi persi a causa della diarrea e per prevenire la disidratazione. -Adulti e bambini sopra i 15 anni: 2 bustine per iniziare, seguite da 1 bustina ogni evacuazione molle, fino a 6 bustine al giorno. - In caso di diarrea cronica e dolore addominale -Esclusivamente adulti: fino a 3 bustine al giorno (1 di mattina, 1 a metà giornata, 1 di sera), come richiesto. Senza consiglio medico, si può utilizzare questo dispositivo medico per un massimo di 2 settimane. Usi prolungati o ripetuti di DiosmectalGo non sono raccomandati. Avvertenze Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non deve essere usato dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. Se si è dimenticato di prendere una dose, prendere la dose dopo la successiva evacuazione molle (movimento intestinale). Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il più comune effetto indesiderato riportato durante il trattamento è la costipazione. Se si verifica costipazione, il trattamento deve essere interrotto e se necessario ripreso a dose giornaliera più bassa. Altri effetti indesiderati meno comuni riportati includono eruzioni cutanee, orticaria, prurito ed angioedema (pelle, labbra, gola e lingua gonfie). Se si nota un qualsiasi altro effetto indesiderato non elencato, o se qualsiasi effetto indesiderato persiste, consultare il medico o il farmacista. Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato grave, si può segnalare al fabbricante Ipsen Consumer HealthCare e/o un operatore sanitario. Conservazione Non c'è alcuna condizione particolare di conservazione. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 12 bustine. Cod. 1054554