

DISINTYL*soluz nebul 100 ml

Marchio: DISINTYL
Codice Min.: 033106028
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE DISINTYL 0,2% SOLUZIONE CUTANEA **CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICA Composti quaternari dell'ammonio. **PRINCIPI ATTIVI** 100 ml di soluzione cutanea contengono: principio attivo: benzalconioclورو 0,2 g. **ECCIPIENTI** Essenza di limone (contiene: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, citrale, d-limonene, idrossicitronellale), colore **E 104**, acqua depurata. **INDICAZIONI** Disinfezione della cute non gravemente lesa (ferite superficiali di piccole dimensioni, abrasioni). Disinfezione dei genitali esterni. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSODOLOGIA** Per la disinfezione della cute non gravemente lesa, applicare la soluzione, senza diluirla, direttamente o con un batuffolo di cotone. Per la disinfezione dei genitali esterni, diluire 1 cucchiaino di prodotto in 1 lt di acqua. Ripetere se necessario l'operazione 2 - 3 volte al giorno, senza superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Conservare in recipiente ben chiuso al riparo dalla luce. **AVVERTENZE** Il prodotto e' solo per uso esterno. Evitare il contatto con occhi, cervello, meningi e orecchio medio e l'utilizzo su cute gravemente lesa. Il prodotto non deve essere usato per trattamenti prolungati: dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, e' necessaria la valutazione medica. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' inoltre dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso e' necessario interrompere il trattamento ed effettuare una valutazione clinica. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. L'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto deve essere evitata. Informazioni importanti su alcuni eccipienti. Il medicinale contiene essenza di limone a sua volta contenente citrale, d-limonene e idrossicitronellale. Citrale, d-limonene e idrossicitronellale possono causare reazioni allergiche. **INTERAZIONI** Il prodotto e' inattivato da detergenti anionici (come i piu' comuni saponi). L'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti deve essere evitato. **EFFETTI INDESIDERATI** e' possibile il verificarsi di intolleranza (bruciore o irritazione) che non richiede modifica del trattamento. Il prodotto e' tossico quando applicato nell'orecchio e tende a ledere la membrana epiteliale corneale. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioniavverse>. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Il prodotto deve essere impiegato in gravidanza e durante l'allattamento solo a seguito di valutazione medica.