

## DULCOSOFT SOLUZIONE ORALE 250 ML

**Marchio:** DULCO  
**Codice Min.:** 971635925  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DulcoSoft** Descrizione Dispositivo medico per il trattamento sintomatico della stitichezza e per ammorbidire le feci. Il componente principale di DulcoSoft è il macroglol 4.000, un lassativo ad azione osmotica. Il macroglol 4.000 ha un'elevata capacità di trattenere l'acqua. Agisce come trasportatore d'acqua e ne ritarda l'assorbimento intestinale, determinandone un aumento della quantità nel colon. Ammorbidisce le feci e aumenta il loro volume. Questo porta ad accelerare il transito intestinale e a rendere l'evacuazione più facile, dando una naturale e delicata sensazione di sollievo dalla stitichezza e dall'irregolarità. Macroglol 4.000 ha una modalità di azione puramente fisica: è praticamente non assorbito dall'organismo e viene escreto inalterato. Componenti Macroglol 4000, sorbato di potassio (conservante), acido citrico, acqua purificata. Senza aroma, zucchero,

lattosio e glutine. Modalità d'uso Diluire con una bevanda a piacere (circa 150 ml). Adulti e bambini al di sopra degli 8 anni: 20-40 ml di soluzione al giorno, (pari a 10-20 g di macroglol 4.000) da assumere preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino. Bambini tra 4-7 anni: 16-32 ml di soluzione al giorno (pari a 8-16 g di macroglol 4.000), da assumere preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino. Bambini tra 2-3 anni: 8-16 ml di soluzione al giorno (pari a 4-8 g di macroglol 4.000), da assumere preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino. Bambini tra 6 mesi e 1 anno: 8 ml di soluzione al giorno (pari a 4 g di macroglol 4.000), da assumere preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino. L'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni deve avvenire preferibilmente sotto controllo medico. Misurare la dose usando il bicchierino dosatore incluso nella confezione. La dose può essere adattata alle esigenze individuali, senza superare la dose massima raccomandata: può variare da un'assunzione al giorno ad un'assunzione ogni due giorni. La dose appropriata è quella minima sufficiente a produrre la regolare evacuazione di feci morbide. La dose giornaliera raccomandata deve essere assunta preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino. L'efficacia del prodotto si manifesta tra le 24 e le 72 ore dall'assunzione. Non assumere per più di 7 giorni. Avvertenze Non assumere in caso di: - ipersensibilità al macroglol 4.000 o ad uno qualsiasi degli altri componenti; - malattie infiammatorie intestinali gravi (come colite ulcerosa, morbo di Crohn) o megacolon tossico; - perforazione gastrointestinale o rischio di perforazione gastrointestinale; - ileo paralitico o sospetto di ostruzione intestinale o stenosi sintomatica; - sindromi addominali dolorose di cui non sia stata stabilita la causa. Se si hanno dubbi, consultare il medico o il farmacista prima di prendere DulcoSoft. DulcoSoft non deve essere assunto quotidianamente per periodi di tempo prolungati senza indagare la causa della stitichezza. In caso di diarrea, si deve usare cautela nei pazienti soggetti a squilibrio idrico o elettrolitico (per esempio anziani, pazienti con compromissione della funzionalità epatica o renale o pazienti in trattamento con diuretici) e si deve prendere in considerazione un controllo degli elettroliti. In caso di

gravidanza e allattamento, consultare prima il medico. Non utilizzare su bambini di età inferiore a 6 mesi. Il macrogol 4.000 aumenta la pressione osmotica nell'intestino e può quindi modificare l'assorbimento intestinale di altri prodotti assunti contemporaneamente. Informare il medico o il farmacista se si sta assumendo qualsiasi altro prodotto. Dosi eccessive di DulcoFosft possono provocare diarrea, dolore addominale, distensione addominale e vomito, che si risolvono quando si interrompe il trattamento o si riduce la dose. Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Non conservare in frigorifero. Non usare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Validità dopo la prima apertura: 6 settimane. Formato Flacone da 250 ml.