

## EDEVEN C.M.\*gel 40 g 2% + 5%

**Marchio:** IBI  
**Codice Min.:** 037028026  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE** EDEVEN C.M. **GEL** **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Farmaci per uso topico, per dolori articolari e muscolari. **PRINCIPI ATTIVI** Edeven C.M. 1% + 5% gel 100 g di gel contengono: escina 1 g, dietilamina salicilato 5 g. Edeven C.M. 2% + 5% gel 100 g di gel contengono: escina 2 g, dietilamina salicilato 5 g. **ECCIPIENTI** Essenza lavanda, essenza nerolene, carbossipolimetilene, meglumina, glicol propilenico, alcol etilico, sodio edetato, esildecano e esildecil laurato, etossidiglicol, butilidrossitoluolo, titanio diossido, acqua depurata. **INDICAZIONI** Traumatologia minore. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** ipersensibilita'

ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Il gel non va impiegato su lesioni aperte (ferite), mucose ed aree cutanee trattate con radiazioni. Non usare per periodi prolungati senza il consiglio di un medico. **POSOLOGIA** Applicare e spalmare un sottile strato di gel sulla cute della zona da trattare da 1 a 3 volte al giorno. La sicurezza e l'efficacia del farmaco nei bambini al di sotto dei 12 anni di eta' non sono state stabilite. **CONSERVAZIONE** Conservare a temperatura non superiore a 25 gradi C. **AVVERTENZE** Non sussistono rischi di assuefazione e dipendenza. Trattandosi di un preparato per applicazioni topiche, il suo uso deve essere esclusivamente esterno. Evitare il contatto con gli occhi. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Informazioni importanti su alcuni eccipienti. Il farmaco contiene butilidrossitoluolo (o butilidrossitoluene) che puo' causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose. **INTERAZIONI** Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali. **EFFETTI INDESIDERATI** Disturbi del sistema immunitario: in rari casi possono comparire reazioni di ipersensibilita' come rossore, desquamazione e disidratazione della pelle. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: dermatite da contatto. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** In caso di gravidanza e durante l'allattamento si sconsiglia di utilizzare il gel se non sotto stretto controllo medico. E' tuttavia opportuno evitare l'uso prolungato (massimo 3 settimane) del prodotto su aree cutanee estese durante la gravidanza. Evitare l'uso del gel sul seno durante l'allattamento.