

## FISIOPAX ADULTI 30 BUSTINE

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 944446665  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**FISIOPAX ADULTI** Descrizione Dispositivo medico ad azione lassativa che, attraverso un'azione di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. Non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. È indicato nel trattamento della stipsi. Grazie alla sua affinità per l'acqua, Fisiopax Adulti ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Senza aromi ed elettroliti. Migliore palabilità. Componenti Ogni bustina contiene 10 g di Makropur, un macrogol 3350 purificato. Senza glutine. Senza lattosio. Modalità d'uso Salvo diversa prescrizione medica, è consigliabile utilizzare Fisiopax Adulti secondo le seguenti modalità. - Adulti:

da 1 a 3 bustine al giorno. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico. La dose massima necessaria non supera normalmente i 30 g di prodotto al giorno. Sciogliere una busta (10 g) in circa 1 bicchiere d'acqua (circa 125 ml). È possibile sciogliere il prodotto in un liquido diverso dall'acqua (tè, latte, brodo o succo di frutta). È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. Avvertenze Conservare il dispositivo e l'eventuale soluzione ottenuta lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Non superare assolutamente le dosi consigliate: in caso di sovradosaggio possono manifestarsi dolori intensi, distensione addominale. Possono inoltre sopraggiungere diarree indotte, con disturbi elettrolitici causati da un'eventuale eccessiva evacuazione. In caso di sospetto sovradosaggio rivolgersi immediatamente al proprio medico. Non usare Fisiopax Adulti per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico. Durante il trattamento con Fisiopax Adulti è consigliabile seguire una dieta adeguata, accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione, si consiglia comunque di consultare il medico. Potrebbero apparire soprattutto in fase iniziale di utilizzo disturbi gastro-intestinali (dolore addominale, borborigmi, diarrea o perdita di feci), oltre a nausea, vomito di grado lieve, distensione addominale, flatulenza, infiammazione e irritazione perianale, effetti che normalmente migliorano riducendo la dose. Molto raramente si sono osservate reazioni allergiche, compresa l'anafilassi. Altri sintomi di reazione allergiche come prurito, orticaria e dispnea. In caso di persistenza degli effetti collaterali sospendere il trattamento e rivolgersi al proprio medico per un consulto. Non utilizzare al di sotto dei 6 mesi. In gravidanza o allattamento, assumere Fisiopax Adulti solo dopo aver consultato il medico. L'assunzione del dispositivo è sconsigliato in caso di: perforazione o ostruzione intestinale dovuta a disordini strutturali o funzionali della parete intestinale, dell'ileo, gravi patologie infiammatorie del tratto intestinale, come

morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico. Non utilizzare in caso di presenza di lesioni gastriche o intestinali note. Ogni bustina è monouso e deve essere aperta solo al momento dell'utilizzo. Non assumere il dispositivo medico durante l'uso di altri dispositivi o specialità medicinali orali: il potere osmotico del macrogol e l'aumento della velocità del transito gastrointestinale indotta possono influire negativamente sulla loro efficacia. Consultare in ogni caso il proprio medico prima di assumere Fisiopax Adulti in caso di altre terapie in atto. Ad oggi non sono note interazioni con farmaci ma è opportuno che l'assunzione del prodotto sia distanziata di almeno due ore da quella dei farmaci somministrati per via orale. Conservazione Conservare la confezione integra in un luogo asciutto e al riparo da fonti luminose o di calore dirette. Conservare il dispositivo al di sotto dei 25°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 30 bustine. Cod. FT004