

FLORBERRY 10 BUSTINE

Marchio: FLORBERRY
Codice Min.: 930325509
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Florberry Descrizione Integratore alimentare a base di mirtillo rosso (cranberry), Lactobacillus paracasei Lpc 37, Frutto-oligosaccaridi (FOS) e Arabinogalattano (AG). Con zucchero ed edulcoranti. Proprietà Una bustina di Florberry garantisce l'apporto di 36 milligrammi di proantocianidine (PACs). Inoltre, il formulato apporta non meno di 5 miliardi di cellule vive di Lactobacillus paracasei Lpc 37 e oltre 2 grammi di fibre dotate di attività prebiotica sia nei confronti del ceppo presente che in generale nei confronti delle specie batteriche utili e benefiche che fanno parte della microflora autoctona intestinale. L'assunzione regolare di Florberry bustine aiuta a mantenere in salute il sistema urinario ed intestinale. Il mirtillo rosso contenuto in Florberry® (cranberry) aiuta a

mantenere la salute del sistema urinario. Florberry agisce in modo combinato su Escherichia coli (tra le cause principali di IVU) sfruttando le qualità del cranberry e del probiotico associato. Le IVU (infezione delle Vie Urinarie) sono causate per circa il 95% dei casi da ceppi di Escherichia coli in grado di aderire selettivamente ai recettori delle cellule uroteliali mediante molecole (adesine) poste all'estremità di particolari formazioni a fasci, definite pili o fimbrie. Le proantocianidine (PACs) contenute nel cranberry agiscono su Escherichia coli, tra le cause principali delle infezioni del tratto urinario, riducendone in vitro la patogenicità. Contemporaneamente, la componente probiotica di Florberry®, riequilibra la microflora intestinale impedendo la colonizzazione dei batteri patogeni nel colon, frequente sorgente autogena dei germi responsabili delle IVU. Questo aspetto è di particolare importanza se si considera che nelle IVU, soprattutto quelle femminili ricorrenti, i batteri colonizzano inizialmente il colon, quindi, attraverso la zona periuretrale/vaginale, risalgono le vie urinarie infettando la vescica e, in alcuni casi, i reni. Risulta pertanto estremamente importante impedire che batteri patogeni colonizzino ed alterino la microflora intestinale. Ingredienti Granulato di estratto di mirtillo rosso (Vaccinium Macrocarpon Aiton, frutti) titolato al 2,77% in proantocianidine con metodo BL-DMAC (arabinogalattano, mirtillo rosso, succo di mirtillo rosso disidratato, agente antiagglomerante: silicio biossido, agente di rivestimento: gomma di xantano); frutto-oligosaccaridi; fruttosio; aromi; fibra vegetale; Lactobacillus paracasei Lpc 37; correttore di acidità: acido citrico anidro; edulcoranti: sucralosio, saccarina sodica. Senza glutine e naturalmente privo di lattosio. Caratteristiche nutrizionali Informazioni per 100 g per bustina da 4,15 g Valore energetico 1452 kJ 344 kcal 60,3 kJ 14,3 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi 0,1 g 0 g Carboidrati di cui zuccheri 76,9 g 31,6 g 3,2 g 1,3 g Fibre 15,9 g 0,7 g Proteine 0,8 g 0,03 g Sale (*) 0,73 g 0,03 g Apporti medi dei componenti funzionali Lactobacillus paracasei Lpc 37 20,5 miliardi U.F.C. 5 miliardi U.F.C. Frutto-oligosaccaridi 27,23 g 1,13 g Granulato di estratto di mirtillo rosso - da cui proantocianidine (PACs) - da cui Arabinogalattano 31,3 g 0,87 g 20,9 g 1,3 g 36 mg 0,87 g(*)

Contenuto dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente Modalità d'uso Versare il contenuto di 1 bustina in circa ½ bicchiere di acqua a temperatura ambiente, mescolare ed assumere immediatamente dopo la preparazione. Dopo aver versato il prodotto in acqua, si consiglia di mescolare molto accuratamente con un normale cucchiaino; un lieve intorbidimento della soluzione non è indice di alterazione ma della naturale sedimentazione dei componenti del prodotto. Per una maggiore efficacia si consiglia di assumere Florberry® la sera, prima di coricarsi o al mattino a digiuno. È bene ricordare che per favorire il flusso urinario ed eliminare i batteri causa dell'infezione è opportuno bere almeno 1,5 - 2 litri di acqua distribuiti nel corso della giornata. Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Durante la gravidanza si consiglia di consultare il proprio medico prima dell'uso. Il prodotto non è indicato al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Possibili interazioni con farmaci: sono state segnalate in letteratura possibili interazioni tra cranberry e Warfarin. Sebbene il dato sia controverso, si consiglia comunque di controllare l'indice INR dei soggetti in terapia anticoagulante. Conservazione Conservare in luogo asciutto ed al riparo dalla luce diretta, ad una temperatura non superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Formato 10 bustine monodose da 4,15 g cad. Cod. 884929