

GLICEROLO (MARCO VITI)*PRIMA INFANZIA 6 contenitori monodose 2,25 g soluz rett con camomilla e malva

Marchio: MARCO VITI
Codice Min.: 030334066
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE GLICEROLO MARCO VITI SOLUZIONE
RETTALE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Lassativi;
clismi. PRINCIPI ATTIVI Glicerolo. ECCIPIENTI Camomilla estratto
fluido; malva estratto fluido; amido pregelatinizzato; acqua
depurata. INDICAZIONI Trattamento di breve durata della
s t i t i c h e z z a
occasionale. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI persensibil
ilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; dolore
addominale acuto o di origine sconosciuta; nausea o
vomito; ostruzione o stenosi intestinale; sanguinamento rettale di
origine sconosciuta; crisi emorroidale acuta con dolore e

sanguinamento; grave stato di disidratazione. POSOLOGIA La dose corretta e' quella minima sufficiente
a produrre una facile evacuazione. E' consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste. Adulti e
adolescenti (12-18 anni): 1 contenitore monodose per adulti da 6,75 g al bisogno, per un massimo di 1 o
2 somministrazioni al giorno. Bambini di 6-11 anni: 1 contenitore monodose per bambini da 4,5 g al
bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno. Bambini di 2-6 anni: 1 contenitore
monodose prima infanzia da 2,75 g al bisogno, per un massimo di 1 o 2 somministrazioni al giorno.
Togliere il tappino. Durante l'operazione, non afferrare mai il soffietto, altrimenti si verificherebbe la
fuoriuscita del medicinale prima dell'utilizzo. Puo' essere utile lubrificare la cannula con una goccia della
soluzione stessa, prima di introdurla nel retto e premere il soffietto. Estrarre la cannula tenendo premuto
il soffietto. Ogni contenitore deve essere utilizzato per una sola somministrazione; eventuale medicinale
residuo deve essere eliminato. Nei bambini CONSERVAZIONE Conservare nella confezione originale
per proteggere il medicinale dalla luce. AVVERTENZE I lassativi devono essere usati il meno
frequentemente possibile e per non piu' di sette giorni. L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la
prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso. Il trattamento della stitichezza
cronica o ricorrente richiede sempre l'intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione dei farmaci e
la sorveglianza nel corso della terapia. E' inoltre opportuno che i soggetti anziani o in non buone
condizioni di salute consultino il medico prima di usare il medicinale. L'abuso di lassativi puo'
causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali (specialmente potassio) ed
altri fattori nutritivi essenziali. Nei casi piu' gravi di abuso e' possibile l'insorgenza di disidratazione o
ipopotassiemia, la quale puo' determinare disfunzioni cardiache o neuromuscolari, specialmente in caso
di trattamento contemporaneo di glicosidici, diuretici o corticosteroidi. L'abuso di lassativi,
specialmente quelli di contatto (lassativi stimolanti), puo' causare dipendenza (e, quindi, possibile

necessita' di aumentare progressivamente il dosaggio), stitichezza cronica e perdita delle normali funzioni intestinali (atonia intestinale). Negli episodi di stitichezza, si consiglia innanzitutto di correggere le abitudini alimentari integrando la dieta quotidiana con un adeguato apporto di fibre ed acqua. Quando si utilizzano lassativi e' opportuno bere al giorno almeno 6-8 bicchieri di acqua, o altri liquidi, in modo da favorire l'ammorbidimento delle feci.

INTERAZIONI Non sono stati effettuati studi specifici di interazione.

EFFETTI INDESIDERATI Patologie gastrointestinali: dolori crampiformi isolati o coliche addominali e diarrea, con perdita di liquidi ed elettroliti, piu' frequenti nei casi di stitichezza grave, nonche' irritazione a livello rettale.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non sono stati effettuati studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Anche se non ci sono evidenti controindicazioni dell'uso del medicinale in gravidanza e durante l'allattamento, si raccomanda di assumere il medicinale solo in caso di necessita' e sotto controllo medico.