

## GUAICALCIUM COMPLEX\*scir 200 ml 0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml

**Marchio:** SIT  
**Codice Min.:** 022895039  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE GUAICALCIUM COMPLEX 0,144 G/100 ML + 2 G/100 ML  
SCIROPPO CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Sedativi della tosse ed  
espettoranti in associazione. PRINCIPALI ATTIVITÀ Dropropizina; potassio  
solfoguaiaicolato. ECCEPIENTI Aconito radice estratto fluido, lauro ceraso (acqua  
distillata aromatica), grindelia estratto fluido, balsamo tolu' estratto fluido,  
etanolo 95%, caramello naturale, estratto aromatico, saccarosio, metile  
paraidrossibenzoato, acqua depurata. INDICAZIONI Sedativo della  
tosse. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI persensibilità ai principi attivi o  
ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati; gravidanza e allattamento; bambini al di  
sotto dei 13 anni d'età. POSOLOGIA Adulti e ragazzi oltre i 13 anni: 1 cucchiaino 2-  
3 volte al giorno. Modo di somministrazione: nella stagione fredda e' consigliabile

somministrare lo sciroppo caldo come punch medicinale, diluendo la dose in acqua, tè o latte molto caldi. Non superare le dosi consigliate. CONSERVAZIONE Nessuna: conservare a temperatura ambiente. AVVERTENZE Il medicinale contiene etanolo. Questo medicinale contiene 6,3 vol. % di etanolo, ad es. fino a 0,76 g per dose, equivalenti a 20 ml di birra, 7,9 ml di vino per dose. Particolare cautela dovrebbe quindi essere usata nella somministrazione ai soggetti con malattie epatiche, alcolismo, epilessia, traumi o malattie cerebrali così come nelle donne in gravidanza. Il farmaco contiene metile para-idrossibenzoato e saccarosio. INTERAZIONI L'alcool contenuto nel medicinale può modificare o aumentare l'effetto di altri farmaci. EFFETTI INDESIDERATI Raramente segnalati nausea ed altri lievi disturbi gastrointestinali. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Il farmaco non deve essere usato in gravidanza e durante l'allattamento.