

HYALISTIL*collirio 5 ml 0,2%

Marchio: HYALISTIL
Codice Min.: 032072062
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE HYALISTIL 0,2% COLLIRIO, SOLUZIONE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Oftalmologici. **PRINCIPI ATTIVI** 0,2% in flacone da 5 ml e da 10 ml. 1 ml di collirio, soluzione contiene: acido ialuronico sale sodico 2 mg. 0,2% in contenitore monodose da 0,25 ml. 1 ml di collirio, soluzione contiene: acido ialuronico sale sodico 2 mg. **ECCIPIENTI** 0,2% in flacone da 5 ml e da 10 ml: sodio cloruro; potassio cloruro; sodio fosfato monobasico monoidrato; disodio fosfato dodecaidrato; tiomersale; acqua depurata. 0,2% in contenitore monodose: sodio cloruro; potassio cloruro; sodio fosfato monobasico monoidrato; disodio fosfato dodecaidrato; acqua depurata. **INDICAZIONI** Trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Ipersensibilita' verso qualsiasi componente della preparazione. **POSOLOGIA** Instillare nel sacco congiuntivale due gocce di collirio 3 o piu' volte al giorno. Prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto. Il medicinale in contenitore monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato. Applicando le gocce evitare che l'estremita' del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie. **CONSERVAZIONE** Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C. Evitare l'esposizione alla luce ed a fonti di calore. **AVVERTENZE** In caso di somministrazione di soluzioni oftalmiche a scopo curativo sospendere l'instillazione del prodotto. L'uso, specie se prolungato, puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. In caso di persistenza o aggravarsi dei sintomi sospendere l'uso e consultare il medico. 0,2% in flacone da 5 ml e da 10 ml: togliere il cappuccio di protezione e svitare il tappo. Capovolgere il flacone ed instillare il collirio esercitando una lieve pressione sul flacone stesso. Richiudere il flacone avvitando il tappo. 0,2% in contenitore monodose Staccare la monodose dalla strip. Aprire ruotando la parte superiore senza tirare. **INTERAZIONI** Non sono noti ad oggi fenomeni di interazioni del farmaco con altri farmaci. E' consigliato comunque evitare l'uso contemporaneo di altre soluzioni detergenti o disinfettanti. **EFFETTI INDESIDERATI** Non sono note reazioni avverse al farmaco ne' locali, ne' sistemiche. Questo medicinale contiene tiomersale (un composto organomercuriale) come conservante e, quindi, possono verificarsi reazioni di sensibilizzazione. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non esistono studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Pertanto il medicinale dovrebbe essere usato solo se il beneficio atteso per la madre e' superiore al rischio per il feto.