

## IDRATON 245 REIDRATANTE ORALE 10 BUSTINE

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 905357721  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



IDRATON 245 Soluzione reidratante orale (ORS) a bassa osmolarità (245 mOsm/l H<sub>2</sub>O), formulata secondo le indicazioni della World Health Organization (WHO) e dello United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). IDRATON 245 ® sfrutta l'esistenza di un sistema enterocitario di co-trasporto del sodio e del glucosio, che rimane intatto in corso di gastroenterite. Sia nelle diarree secretive sia in quelle osmotiche la funzionalità di questo sistema permette il passaggio di acqua dal lume intestinale all'enterocita e dall'enterocita al plasma, purché somministrata contemporaneamente a sodio e glucosio correttamente diluiti e nel corretto rapporto. Gusto arancia. Ingredienti e caratteristiche nutrizionali per 1 bustina da g 4,7 (per 200 ml di bevanda pronta)per 5

bustine per g 23,5 (per 1 litro di bevanda pronta) Valore energetico kcal 15,8 / kJ 66,9 kcal 79,1 / kJ 335,0 Proteine 0,075 g 0,4 g Carboidrati 3,376 g 16,9 g Grassi 0,230 g 1,1 g Glucosio 2,700 g 13,500 g / 75 mMol per litro Potassio 0,156 g 0,782 g / 20 mMol per litro Sodio 0,345 g 1,724 g / 75 mMol per litro Citrati 0,385 g 1,923 g / 10 mMol per litro Cloruri 0,461 g 2,304 g / 65 mMol per litro Osmolarità mOsm/l 245 (245) mMol per litro \* tra parentesi i valori suggeriti da OMS; quelli indicati da Innovares sono valori medi. Modalità d'uso Disidratazione di grado severo: sciogliere 1 bustina ogni 200 ml di acqua naturale (5 bustine in 1 litro); assumere 1 o 2 litri di bevanda giornalmente oppure secondo il parere del medico. Rispettare l'anzidetto rapporto per ottenere la corretta concentrazione elettrolitica (245 mOsm/l). Nelle altre condizioni di disidratazione e/o di intensa perdita idrosalina e di aumentato fabbisogno idrosalino: 2/3 bustine in un litro d'acqua, assumendo la bevanda a piacere. Controindicazioni Insufficienza renale grave, scompenso cardiaco grave, ileo dinamico. Avvertenze In caso di insufficienza renale e scompenso cardiaco consultare il Medico curante prima di assumere il preparato. Per i bambini sentire il parere del Pediatra. In gravidanza ed allattamento sentire il parere del Medico. Si segnala la presenza di sucralosio, un edulcorante ricavato dallo zucchero (saccarosio). Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Formato Astuccio da 10 bustine di polvere. Cod. IDR001000000