

KALOPA*21 cpr riv

Marchio: SCHWABE PHARMA
ITALIA

Codice Min.: 038135012

Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEKALOPA COMPRESSE RIVESTITE CON FILM. KALOPA GOCCE ORALI, SOLUZIONE.**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento.**PRINCIPI ATTIVI**Compresse. Una compressa rivestita con film contiene: 20 mg di estratto (come estratto liquido essiccato) di Pelargonium sidoides DC, radix(Pelargonio radice) (1:8 - 10) (EPs 7630). Solvente di estrazione: etanolo 12% (v/v). Eccipiente con effetti noti: lattosio monoidrato. Gocce. 10g (= 9,75ml) di soluzione contengono: 8,0g di estratto (come estratto liquido) di Pelargonium sidoides DC, radix (Pelargonio radice) (1: 8 - 10) (EPs 7630). Solvente di estrazione: etanolo 12% (v/v). Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1.**ECCIPIENTI**Compresse: maltodestrina; cellulosa microcristallina; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; silice precipitata; magnesio stearato; ipromellosa 5 mPas; macrogol 1500; ferro ossido giallo E 172; ossido di ferro rosso E 172; titanio diossido E 171; talco; simeticone; metilcellulosa; acido sorbico. Gocce: glicerolo all'85%.**INDICAZIONI**Medicinale tradizionale di origine vegetale indicato per il trattamento sintomatico del raffreddore comune negli adulti e adolescenti di eta' superiore ai 12 anni. L'impiego di questo medicinale tradizionale di origine vegetale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1; tendenza al sanguinamento; assunzione di farmaci che inibiscono la coagulazione; insufficienza renale grave; insufficienza epatica grave.**POSOLOGIA**Posologia. Compresse. Adulti e adolescenti di eta' superiore a 12 anni: la dose raccomandata e' 1 compressa 3 volte al giorno. Gocce. Adulti e adolescenti di eta' superiore a 12 anni: la dose raccomandata e' 30gocce (corrispondenti a circa 20 mg di estratto liquido essiccato di pelargonio) 3 volte al giorno. 30 gocce di soluzione corrispondono a circa 1,5 ml di soluzione. Durata del trattamento La durata massima del trattamento e' di 7 giorni. Popolazioni speciali. Non sono disponibili informazioni su pazienti con compromissione epatica e renale. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di KALOPA nei bambini di eta' inferiore ai 12 anni non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione. Compresse: KALOPA deve essere assunto con un po' di liquido, senza essere masticato. Gocce: KALOPA puo' essere assunto direttamente con un cucchiaio oppure diluito in un po' di liquido.**CONSERVAZIONE**Compresse: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Gocce: non conservare a temperatura superiore ai 30 gradi C. Nota: gli estratti a base di piante in forma liquida possono intorbidirsi con il tempo, cio' non influenza l'efficacia del prodotto. Poiche' KALOPA e' un prodotto naturale, possono verificarsi lievi variazioni nel colore e nel gusto.**AVVERTENZE**Sono stati riportati casi di epatotossicita' ed epatiti in associazione alla somministrazione del medicinale. In presenza di segni di epatotossicita' la somministrazione del medicinale deve essere interrotta immediatamente ed e' necessaria una rivalutazione del caso. Il

trattamento deve essere interrotto anche in caso di tachipnea o di emottisi. Informazioni importanti su alcuni eccipienti. Compresse: KALOPA contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. Gocce: KALOPA contiene etanolo (alcol) al 12% (v/v) che corrisponde a 180 mg di alcool per ogni singola dose (30 gocce) equivalente a 3.6 ml di birra o 1.5 ml di vino per dose. Può essere dannoso per gli alcolisti. Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia. Evitare l'uso concomitante di altri prodotti contenenti alcool. INTERAZIONI Non sono stati effettuati studi d'interazione. A causa della possibile influenza sui parametri della coagulazione, non può essere escluso che KALOPA aumenti gli effetti di farmaci anticoagulanti assunti in concomitanza come il fenprocumone e il warfarin. EFFETTI INDESIDERATI La valutazione delle reazioni avverse si basa sulle seguenti informazioni relative alla frequenza: molto comune: (>1/10); comune: (>=1/100, 1/1000, =1/10000), GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO La sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno non è stata stabilita. La somministrazione di KALOPA durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno non è raccomandata e deve essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per la madre supera il rischio per il feto o il bambino.