

LENIRIT MICOSI*crema derm 30 g 1%

Marchio: LENIRIT
Codice Min.: 036932010
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE CLOTRIMAZOLO EG 1% **CREMA** **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antimicotici per uso dermatologico. **PRINCIPI ATTIVI** Clotrimazolo 1 g/100 g. **ECCIPIENTI** Sorbitan monostearato, polisorbato 60, spermaceti, alcool cetilstearyllico, 2-ottildodecanolo, alcool benzilico, acqua depurata. **INDICAZIONI** Micosi della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Applicare in piccola quantita' due-tre volte al giorno in corrispondenza della zona affetta, frizionando leggermente, dopo aver lavato ed asciugato accuratamente la parte. La crema e' specialmente indicata per il trattamento delle zone cutanee glabre (senza peli). In genere, per la scomparsa delle manifestazioni, e' sufficiente un periodo di trattamento senza interruzione di tre-quattro settimane. Al fine di consolidare i risultati terapeutici ottenuti ed evitare reinfezioni, e' opportuno proseguire la terapia per almeno due settimane dopo la scomparsa delle manifestazioni. Per evitare recidive, assai comuni nelle micosi, e' bene osservare alcune elementari norme igieniche: frequente ricambio della biancheria intima; degli asciugamani e loro disinfezione chimica o termica; evitare promiscuita' degli indumenti e della biancheria. **CONSERVAZIONE** Nessuna particolare precauzione. **AVVERTENZE** L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In caso di reazioni di ipersensibilita' e' necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. Nelle dermatiti da pannolino si sconsiglia l'impiego di pannolini ad effetto "occlusivo" dopo l'applicazione della crema. **INTERAZIONI** Non sono state segnalate interazioni nelle comuni terapie di pertinenza. **EFFETTI INDESIDERATI** Raramente possono manifestarsi reazioni di intolleranza locale quali: irritazioni, sensazione di bruciore e prurito. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto va somministrato solo in caso di effettiva necessita'.