

METARECOD 40 BUSTINE GRANULARI X 2,5G GUSTO ARANCIA E PESCA

Marchio: ABOCA
Codice Min.: 979232648
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Metarecod Descrizione Metarecod è un dispositivo medico utile per il trattamento della sindrome metabolica e il riequilibrio di parametri metabolici alterati quali livelli di colesterolo, trigliceridi, glucosio e valori di circonferenza addominale. Metarecod, grazie all'insieme di tutti i componenti della sua formulazione, agisce modificando le caratteristiche fisiche del contenuto intestinale, diluendo la concentrazione di grassi e carboidrati, e in particolare: - rendendo più graduale l'assorbimento di queste sostanze (effetto retard), riducendo al contempo anche la quantità totale assorbita; - riequilibrando la flora intestinale, utile per un più rapido e stabile miglioramento delle funzioni metaboliche; - normalizzando il transito intestinale, che favorisce ulteriormente

l'eliminazione di grassi (colesterolo e trigliceridi) e carboidrati (tra cui il glucosio). Inoltre il prodotto riduce il riassorbimento di acidi biliari contribuendo a riequilibrare i livelli di colesterolo circolante e, grazie alla sua viscosità, si interpone tra il contenuto intestinale (ricco in grassi oltre che eventuali sostanze irritanti) e la mucosa, favorendone la protezione. Tutto ciò favorisce un migliore utilizzo dei nutrienti da parte del fegato, promuovendo il riassetto di glicemia, colesterolemia, trigliceridemia e una diminuzione della circonferenza addominale. L'assunzione del prodotto deve essere accompagnata da uno stile di vita sano che comprenda un'alimentazione bilanciata ed una regolare attività fisica. Metarecod è un dispositivo medico naturale e biodegradabile al 100%, non contiene sostanze di sintesi, emi-sintesi o geneticamente modificate. Indicato in caso di: - livelli di colesterolo LDL ≥ 100 mg/dl o di colesterolo HDL ≤ 40 mg/dl nei maschi e ≤ 50 mg/dl nelle femmine; - livelli di trigliceridi ≥ 150 mg/dl; - livelli di glucosio a digiuno ≥ 100 mg/dl (IFG) o alterata tolleranza al glucosio (o ridotta tolleranza al glucosio) 140-199 mg/dl (IGT); - elevati valori di circonferenza addominale anche in soggetti normopeso (≥ 94 cm nei maschi e ≥ 80 cm nelle femmine). Con stevia. Senza zuccheri aggiunti e edulcoranti di sintesi. Gusto arancia e pesca. Componenti Complesso naturale a base di macromolecole polisaccaridiche (NeoPolicaptil* Gel Retard, 86%); aroma naturale di arancia e pesca; gomma arabica; stevia foglie polvere. Senza glutine. *NeoPolicaptil Gel Retard è un complesso macromolecolare frutto della ricerca Aboca, realizzato attraverso una tecnologia produttiva che permette di ottenere un prodotto 100% naturale senza ingredienti di sintesi. Modalità d'uso Indicato per adulti e bambini a partire dagli 8 anni. Disperdere una bustina in mezzo bicchiere d'acqua prima dei due pasti principali. Ingerire prima che la bevanda ottenuta dia luogo alla formazione del gel nel bicchiere. Dopo l'assunzione, bere un ulteriore mezzo bicchiere di acqua. Se si dimentica di assumere Metarecod prima del pasto, lo si può assumere anche durante. Il prodotto non può essere assunto direttamente in bocca, da consumarsi rigorosamente previa dispersione in acqua. Nei primi giorni di utilizzo si possono

verificare fenomeni di meteorismo che si risolvono spontaneamente durante il prosieguo del trattamento. Ai fini della corretta assunzione del prodotto da parte di bambini al di sotto dei 12 anni d'età, è consigliabile la presenza di un adulto. Seppur i primi miglioramenti si verificano già dopo il primo mese di terapia, è consigliabile assumere il prodotto per almeno 3 mesi. È possibile comunque ripetere il ciclo di trattamento più volte nell'arco dell'anno. Avvertenze Non assumere il prodotto in caso di allergia o ipersensibilità individuale ad uno o più delle seguenti materie prime da cui derivano i componenti del prodotto: Avena sativa, Opuntia Ficus Indica, Amorphophallus konjac, Althea officinalis, Linum usatissimum, Tilia platyphyllos, Cichorium intybus, Stevia rebaudiana, gomma arabica. Non vi sono dati sperimentali sull'uso di Metarecod in gravidanza e allattamento. Tuttavia, per la natura dei suoi componenti non vi sono controindicazioni per l'assunzione del prodotto in queste condizioni. Si ricorda che il trattamento di disglucemie, dislipidemie, sovrappeso e sindrome metabolica in gravidanza è da effettuare sotto controllo del medico. Si consiglia di assumere il prodotto ad almeno due ore dall'assunzione di farmaci per evitare una possibile interazione con il loro assorbimento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 40 bustine monodose da 2,5 g ciascuna. Cod. MET40GRX