

MYLICON*BB gtt orale 30 ml

Marchio: MYLICON
Codice Min.: 020708069
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONEMYLICON**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Altri farmaci per disturbi funzionali intestinali.**PRINCIPI ATTIVI**1 ml contiene: simeticone (dimetilpolisilossano attivato) 66,6 mg.**ECCIPIENTI**Acido citrico monoidrato; sodio citrato; metilidrossipropilcellulosa;carbossipolimetilene; saccarina; sodio benzoato; acido sorbico; sodiobicarbonato; essenza di lampone; essenza concentrata di vaniglia; acqua depurata.**INDICAZIONI**Trattamento sintomatico del meteorismo gastro-enterico e dell'aerofagia del lattante e del bambino.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' verso il principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Generalmente controindicato in gravidanza.**POSOLOGIA**Lattanti e bambini: 20 gocce (= 0,6 ml), 2-4 volte al di preferibilmente dopo i pasti o altrimenti secondo prescrizione medica. Agitare

bene prima dell'uso.**CONSERVAZIONE**Non sono previste particolari condizioni di conservazione.**AVVERTENZE**Non superare le dosi consigliate.**INTERAZIONI**Non sono note, ne' sono state segnalate, incompatibilita' con altri farmaci.**EFFETTI INDESIDERATI**Non sono stati messi in evidenza effetti indesiderati dovuti al farmaco.**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Gravidanza. Non vi sono dati adeguati sull'uso nelle donne in gravidanza, pertanto non dovrebbe essere usato in gravidanza a meno di una reale necessita' e dopo valutazione del rischio/beneficio da parte del medico. Allattamento. Non e' noto se il simeticone venga escreto nel latte materno. L'escrezione del simeticone nel latte materno non e' stata studiata negli animali. La decisione se continuare/interrompere l'allattamento o continuare/interrompere la terapia a base di simeticone dovrebbe essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il neonato e della terapia a base di simeticone per la donna.