

MYLICONGAS*50 cpr mast 40 mg

Marchio: MYLICON
Codice Min.: 038140012
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE MYLICONGAS CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Altri farmaci per disturbi funzionali intestinali. **PRINCIPI ATTIVI** Simeticone (dimetilpolisilossano attivato) 40 mg. **ECCipienti** Saccarina; acido alginico; lattosio; sodio bicarbonato; povidone; calcio silicato idrato; magnesio stearato. **INDICAZIONI** Trattamento sintomatico del meteorismo gastro-enterico, e dell'aerofagia dell'adulto. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Generalmente controindicato in gravidanza. **POSOLOGIA** Adulti: 4 compresse al giorno (2 alla fine di ogni pasto principale). Le

compresse devono essere masticate. **CONSERVAZIONE** Conservare il medicinale nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce e dall'umidita'. **AVVERTENZE** Non superare le dosi consigliate. Il medicinale contiene lattosio non e' quindi adatto per i soggetti con deficit di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento glucosio/galattosio. **INTERAZIONI** Non sono note, ne' sono state segnalate, incompatibilita' con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** Non sono stati messi in evidenza effetti indesiderati dovuti al farmaco. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non vi sono dati adeguati sull'uso nelle donne in gravidanza, pertanto non dovrebbe essere usato in gravidanza a meno di una reale necessita' e dopo valutazione del rischio/beneficio da parte del medico. Non e' noto se il simeticone venga escreto nel latte materno. L'escrezione del simeticone nel latte materno non e' stata studiata negli animali. La decisione se continuare/interrompere l'allattamento o continuare/interrompere la terapia a base di simeticone dovrebbe essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il neonato e della terapia a base di simeticone per la donna.