

NAN SUPREME PRO 1 400 G

Marchio: NESTLE
Codice Min.: 941437168
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Nestlé NAN SUPREMEpro 1 Latte per lattanti Dalla nascita Descrizione Latte per lattanti in polvere, indicato dalla nascita, in assenza totale o parziale del latte materno. Contiene DHA. Unicamente lattosio. Senza olio di palma. Dopo NESTLÉ NAN SUPREMEpro 1, su indicazione del pediatra, si potrà passare ad un latte di proseguimento come NESTLÉ NAN SUPREMEpro 2. Ingredienti Lattosio, oli vegetali (girasole, colza), concentrato di siero di latte a proteine idrolizzate*, miscela 2'-fucosillattosio/difucosillattosio (2'-FL/DFL) (contiene lattosio), olio di pesce, glicerofosfato di calcio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, bitartrato di colina, cloruro di magnesio, latte-N-tetraosio (LNT) (contiene lattosio), olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di calcio, citrato di potassio, cloruro di potassio, L-arginina, sale sodico di 6'-sialil-lattosio (6'-SL) (contiene lattosio), L-istidina, cloruro

di sodio, L-ascorbato di sodio, L-tirosina, inositolo, L. reuteri DSM17938**, taurina, sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) (contiene lattosio), L-carnitina, solfato ferroso, solfato di zinco, 5' monofosfato di citidina, D-pantotenato, calcio, 5' monofosfato di uridina, nicotinamide, acetato di DL-alfa-tocoferile, 5' monofosfato di adenosina, 5' monofosfato di guanosina, solfato rameico, riboflavina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Senza glutine.

*L'enzima utilizzato è di origine non Halal/Kosher. **Licenza di BioGaia AB. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 g di polvere per 100 ml al 13,1% p/v Energia 2.138 kJ 511 kcal 280 kJ 67 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi 26,4 g 2,5 g 3,5 g 0,3 g Acido linoleico 3.850 mg 505 mg Acido alfa-linoleico 330 mg 43 mg Acido docosaesaenoico (DHA) 130 mg 17 mg Acido arachidonico (ARA) 130 mg 17 mg Carboidrati di cui zuccheri 58,1 g 58,1 g 7,6 g 7,6 g Lattosio 58,1 g 7,6 g Fibre 1,3 g 0,17 g 2'-FL 0,798 g 0,105 g DFL 0,111 g 0,015 g LNT 0,264 g 0,035 g 6'-SL 0,125 g 0,016 g 3'-SL 0,027 g 0,004 g Proteine 9,7 g 1,3 g Vitamina A 440 mcg-RE 57,7 mcg-RE Vitamina D 12 mcg 1,5 mcg Tiamina 495 mcg 65 mcg Riboflavina 1.100 mcg 146 mcg Niacina 5,0 mg 0,65 mg Acido pantotenico 5,6 mg 0,73 mg Vitamina B6 370 mcg 50 mcg Biotina 13 mcg 1,7 mcg Folato 158 mcg-DFE 20,7 mcg-DFE Vitamina B12 1,4 mcg 0,18 mcg Vitamina C 63 mg 8,3 mg Vitamina K 38 mcg 4,9 mcg Vitamina E 12 mg TE 1,6 mg TE Sodio 185 mg 24 mg Potassio 568 mg 74,5 mg Cloruro 506 mg 66,3 mg Calcio 336 mg 44,1 mg Fosforo 186 mg 24,4 mg Magnesio 50,0 mg 6,56 mg Ferro 2,5 mg 0,33 mg Zinco 3,4 mg 0,45 mg Rame 420 mcg 55 mcg Iodio 107 mcg 14,0 mcg Selenio 28 mcg 3,6 mcg Manganese 95 mcg 13 mcg Fluoruro ≤60 mcg ≤7,9 mcg Taurina 30 mg 3,9 mg Colina 180 mg 24 mg Inositolo 36 mg 4,8 mg L-carnitina 12 mg 1,6 mg Nucleotidi 15 mg 2,0 mg Modalità d'uso Lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani. Lavare con cura biberon, tettarella e ghiera. Bollire il tutto per 5 minuti e tenerli coperti fino all'uso. Bollire per 5 minuti acqua potabile e lasciarla intiepidire. Seguire attentamente la Tabella di Alimentazione. Versare nel

biberon la quantità di acqua indicata; aggiungere poi il numero di misurini rasi di polvere indicato. Assicurarsi che il misurino sia asciutto e riporlo nel barattolo, appoggiandolo sul bordo interno. Chiudere il barattolo. Chiudere il biberon e agitare fino a completa dissoluzione della polvere. Verificare la temperatura del latte prima di somministrarlo. Tabella di Alimentazione: Quantità per pasto N° pasti al giorno Età del lattante Acqua precedentemente bollita * N° di misurini ** Biberon 1° e 2° settimana 90 ml 36 3° e 4° settimana 120 ml 45 2° mese 150 ml 55 3° e 4° mese 180 ml 65 5° e 6° mese 210 ml 75 Il misurino contiene 4,4 g di polvere * Per mantenere in vita il maggior numero di fermenti lattici, l'acqua bollita deve essere raffreddata a temperatura idonea per il lattante prima di aggiungere la polvere. ** Usare esclusivamente il misurino all'interno della confezione. L'uso di quantità maggiori o minori di polvere rispetto a quelle indicate può essere causa di disidratazione o ridotto apporto nutrizionale. Non cambiare le quantità indicate senza il parere del medico. Avvertenze Seguire le istruzioni esattamente. L'uso di acqua e biberon non bolliti, la ricostituzione, la conservazione, la manipolazione o la somministrazione non corrette possono essere causa di rischi per la salute del lattante. Preparare solamente un biberon alla volta. Preparare il latte solo al momento del pasto e consumarlo subito. Non conservare mai il latte avanzato nel biberon. Verificare sul dorso della mano la temperatura del latte prima di somministrarlo. Non lasciare mai il lattante da solo durante la poppata per evitare che soffochi. Evitare di conservare il prodotto ad alte temperature per un periodo prolungato. Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e l'allattamento al seno dovrebbe durare più a lungo possibile. In mancanza totale o parziale del latte materno, prima di scegliere un latte per lattanti è necessario interpellare il pediatra. Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Validità a confezionamento integro: 18 mesi. Validità post-apertura: 4 settimane. Formato Barattolo da 400 g Cod. 12467154