

## NEBIOTIN\*30 cpr 5 mg

**Marchio:** DIFA COOPER  
**Codice Min.:** 033765013  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE** NEBIOTIN 5 MG COMPRESSE **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Vitamine. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni compressa contiene 5 mg di Biotina. **ECCIPIENTI** Sodio stearato, amido di riso. **INDICAZIONI** Trattamento delle condizioni di carenza (stati carenziali) di biotina. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Allergia alla biotina, a sostanze simili (correlate da un punto di vista chimico) o ad uno qualsiasi degli altri componenti del medicinale elencati al paragrafo 6.1. **POSOLOGIA** Assumere 3-4 compresse al giorno, deglutendole con acqua. **CONSERVAZIONE** Conservare a temperatura non superiore a 25 gradi C. **AVVERTENZE** Rivolgersi al medico o al farmacista prima di assumere il medicinale. Dopo un breve periodo di trattamento, senza miglioramenti o in caso di peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni, consultare il medico. **Interferenza con esami clinici di laboratorio** La biotina puo' interferire con i test diagnostici di laboratorio basati sull'interazione biotina/streptavidina, producendo risultati falsamente diminuiti o falsamente aumentati, a seconda del test utilizzato. Il rischio di interferenza e' maggiore nei bambini e nei pazienti con insufficienza renale e aumenta all'aumentare della dose. Nell'interpretazione dei risultati degli esami di laboratorio devono essere prese in considerazione possibili interferenze della biotina, specialmente se si osserva una mancanza di coerenza con la presentazione clinica (ad esempio, risultati di esami tiroidei che suggeriscono la malattia di Graves in pazienti asintomatici che assumono biotina o risultati falsi negativi dell'esame dell'altroponina in pazienti con infarto miocardico che assumono biotina). Nei casi di sospetta interferenza occorre utilizzare, se disponibili, test diagnostici alternativi non sensibili a interferenze con la biotina. E' necessario consultare il personale di laboratorio quando si prescrivono esami di laboratorio in pazienti che assumono biotina. **INTERAZIONI** Informare il medico o il farmacista se si sta assumendo, o si ha recentemente assunto o si potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Durante il trattamento con il medicinale non consumare uova crude perche' l'albume dell'uovo crudo contiene avidina, una sostanza che rende inefficace la biotina. **EFFETTI INDESIDERATI** Come tutti i medicinali, questo medicinale puo' causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati: molto rari (possono interessare fino a 1 su 10.000 persone): reazioni allergiche come irritazioni della pelle (manifestazioni cutanee di tipo eritematoso od orticarioide). Segnalazione delle reazioni avverse sospette. Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati nel foglio illustrativo, rivolgersi al medico o al farmacista. La segnalazione degli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione viene effettuata all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). La segnalazione degli effetti indesiderati puo' contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del medicinale. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** **Gravidanza:** In caso di stato di gravidanza in atto, se si sospetta o si pianifica una gravidanza, chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di assumere il medicinale. **Allattamento:** se si sta allattando con latte materno, chiedere consiglio al medico o al

farmacista primadi assumere il medicinale.