

NEOBIANACID PEDIATRIC 36 BUSTINE GRANULARI

Marchio: NEOBIOANACID
Codice Min.: 980430577
Link: [clicca qui per acquistare](#)



NeoBianacid Pediatric Descrizione NeoBianacid Pediatric è un dispositivo medico a base di complessi molecolari vegetali e minerali naturali, che svolge un'azione protettiva e lenitiva della mucosa gastroesofagea, utile per contrastare rapidamente la sensazione di acidità, il bruciore, il dolore ovvero i sintomi tipici dell'irritazione e dell'infiammazione della mucosa stessa. NeoBianacid Pediatric agisce riproducendo i meccanismi fisiologici di difesa del tratto gastroesofageo grazie a Poliprotect, complesso molecolare frutto della ricerca Aboca, e alla frazione flavonoidica che proteggono la mucosa dall'azione dei succhi gastrici e contrastano l'irritazione dovuta ai radicali liberi. In particolare, Poliprotect forma un film ad effetto barriera

(componente polisaccaridica con proprietà mucoadesive) e svolge un'azione tamponante locale (componente minerale da Limestone e Nahcolite). NeoBianacid Pediatric è indicato nei bambini al di sopra di 1 anno di età per il trattamento delle problematiche connesse al reflusso gastroesofageo, quali rigurgiti, vomito e dolore addominale. È indicato anche nel trattamento della dispepsia funzionale, caratterizzata da uno o più dei seguenti sintomi: difficoltà di digestione, sensazione di pienezza post-prandiale, sazietà precoce, dolore o bruciore epigastrico. **Ingredienti** -Poliprotect: complesso molecolare sinergico di polisaccaridi* (ottenuti da Aloe vera, Malva sylvestris e Althaea officinalis) e minerali naturali Limestone e Nahcolite titolato in polisaccaridi (peso molecolare >20.000 dalton) ≥7,6% (20 mg per bustina granulare). -Frazione flavonoidica* (ottenuta da Matricaria recutita e Glycyrrhiza glabra). - Contiene inoltre: zucchero di canna*, aroma naturale. *Ingrediente da agricoltura biologica. **Modalità d'uso** Assumere il contenuto di una bustina disciolto in poca acqua dopo i pasti principali e prima di mettersi a letto. Si consiglia un dosaggio massimo giornaliero di 4 bustine per i bambini da 1 a 3 anni e di 6 bustine per i bambini da 4 a 6 anni. Il prodotto può essere assunto anche per periodi prolungati. **Avvertenze** Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Se i sintomi persistono consultare il pediatra. Si consiglia di assumere il prodotto a distanza di almeno due ore da farmaci la cui efficacia può essere ridotta dalla contemporanea somministrazione di calcio. **Conservazione** Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. **Formato Confezione** da 36 bustine granulari monodose da 775 mg ciascuna. **Cod. ANAPEGRX**