

NEOMERCUCROMO* soluz cutanea 50 ml

Marchio: NEOMERCUCROMO

Codice Min.: 032246047

Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE NEOMERCUCROMO **SOLUZIONE CUTANEA**
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Antisettici e disinfettanti (Fenolo e derivati).
PRINCIPI ATTIVI 100 ml contengono: eosina: 2,0 g; cloroxilenolo: 0,3 g; propilenglicole: 30,0 g.
ECCIPIENTI Etanolo 95.; sodio edetato; acido acetico; acqua depurata.
INDICAZIONI Trattamento locale disinfettante di ferite superficiali di lieve entita', abrasioni, ustioni di primo grado, piaghe da decubito con interessamento limitato all'epidermide.
CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
POSOLOGIA Posologia: applicare 1-2 volte al giorno alcune gocce sulla parte lesa. Non superare le dosi consigliate.

Modo di somministrazione: applicare la soluzione cutanea sulla parte lesa e

coprire eventualmente con un bendaggio appropriato sterile asciutto.
CONSERVAZIONE Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Tenere il flacone ben chiuso, lontano da fonti di calore.
AVVERTENZE Il prodotto e' solo per uso esterno e non deve essere usato per trattamenti prolungati. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso e' necessario interrompere il trattamento e valutare la necessita' di una terapia idonea. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Il medicinale lascia macchie difficilmente eliminabili sugli indumenti. Il contenitore di questo medicinale e' costituito di gomma latex. Puo' causare gravi reazioni allergiche.
INTERAZIONI Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.
EFFETTI INDESIDERATI E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Per applicazione ripetuta o in seguito a bendaggio occlusivo, si possono avere reazioni eczematose della cute. La soluzione puo' dare luogo a fenomeni di fotosensibilizzazione. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Gravidanza: non si ritiene che l'eosina, il cloroxilenolo e il propilenglicole possano causare effetti durante la gravidanza, dal momento che l'esposizione sistemica a eosina, cloroxilenolo e propilenglicole e' trascurabile. Questo farmaco puo' essere usato durante la gravidanza.