

NORMAST 3 90 COMPRESSE

Marchio: NORMAST
Codice Min.: 979071065
Link: [clicca qui per acquistare](#)



NORMAST 3 Descrizione Alimento destinato a fini speciali. La Sindrome Ipocinetica dell'Anziano e la Sindrome Metabolica del Diabetico costituiscono fattori di rischio crescente-spesso tra loro sinergici-per l'insorgenza di una inadeguata modulazione della neuroinfiammazione di basso grado (low-grade neuroinflammation), destinati ad alterare progressivamente l'equilibrio del Sistema Neuro-Immuno Vascolare. Ne conseguono sintomatologie algiche di tipo infiammatorio, turbe del sistema muscolo scheletrico e, soprattutto, alterazioni del sistema nervoso autonomico innervante la parete dei vasi, principalmente arteriosi; alterazioni che esitano in danni funzionali a carico della elasticità del vaso e della integrità della parete

interna dello stesso. Il principio attivo Rutamid interviene sia sulla neuroinfiammazione di basso grado-mastocita dipendente- sia sulla reattività elastica del vaso. L'associazione con l'idrossitiroso, un principio attivo dell'olio di oliva dotato di straordinario potere antiossidante, concorre a determinare un adeguato controllo della componente lipidica circolante. Normast 3 è da utilizzare sotto controllo medico, per il regime alimentare di soggetti con disturbi sostenuti da processi neuroinfiammatori. Ingredienti Palmitoiletanolamide-rutina in forma co-micronizzata (dim. particellare 2,0-10,0 micron), idrossitiroso; emulsionanti: cellulosa microcristallina, sali di magnesio degli acidi grassi, e1521; stabilizzanti: maltodestrine, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, polivinilpirrolidone, alcol polivinilico; antiagglomeranti: biossido di silicio, talco; coloranti: E171, E101, E120. Senza glutine. Caratteristiche nutrizionali Valori medi1 compressa100 g Energia 12,7 kJ3,0 kcal2.118 kJ506 kcal Proteine Carboidrati di cui zuccheri0,084 g-14,0 g- Grassidi cui acidi grassi saturi0,30 g0,26 g50,0 g42,8 g Fibre0,12 g20,0 g Sale0,005 g0,8 g Palmitoiletanolamide0,300 g50,0 g Rutina0,06 g10,0 g Idrossitiroso0,015 g2,5 g Modalità d'uso Su indicazione medica, in linea orientativa, 1-2 compresse al giorno. Avvertenze Usare sotto controllo medico. Il prodotto non può rappresentare l'unica fonte di nutrimento. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza. Conservazione Conservare il prodotto a temperatura ambiente. Validità a confezione integra: 36 mesi. Formato Confezione contenete 90 compresse. Cod. 8100