

NUTRAMIGEN 2 LGG POLVERE 400 G

Marchio: NUTRAMIGEN
Codice Min.: 903968105
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Nutramigen 2 LGG Descrizione Formula nutrizionalmente completa a base di caseina estesamente idrolizzata, realizzata per soddisfare il fabbisogno giornaliero del lattante con allergia alle proteine del latte vaccino. È la prima formula per lattanti allergici con i livelli di DHA (Omega 3) raccomandati, che favoriscono il normale sviluppo visivo. Nutramigen 2 contiene il probiotico LGG, una combinazione che favorisce la gestione dietetica dell'allergia al latte vaccino e che aiuta a ritornare più velocemente ad una dieta normale. La formula estesamente idrolizzata ha un sapore ed un odore diverso dalle formule standard per l'infanzia; occorre quindi far abituare il lattante. Ingredienti Sciroppo di glucosio, oli vegetali (palma, cocco, soia, girasole), idrolizzato estensivo di caseina (da

latte), amido di mais modificato, fosfato di calcio, citrato di calcio, citrato di potassio, cloruro di potassio, oli derivati da organismi unicellulari (ARA da *Mortierella alpina* e DHA da *Cryptocodinium cohnii*), L-cistina, cloruro di colina, L-ascorbato di sodio, L-tirosina, inositolo, L-triptofano, solfato ferroso, coltura di *Lactobacillus rhamnosus GG* (0,034%), taurina, solfato di zinco, L-carnitina, nicotinamide, DL-alfatocoferolo acetato, ascorbil palmitato, acido ascorbico, pantotenato di calcio, solfato di rame, piridossina cloridrato, retinil palmitato, riboflavina, tiamina cloridrato, colecalciferolo, solfato di manganese, cloruro di cromo, ioduro di sodio, acido folico, molibdato di sodio, fitomenadione, selenito di sodio, D-biotina, cianocobalamina. Caratteristiche nutrizionali Analisi media per 100 g di polvere per 100 ml pronti all'uso

Energia 480 kcal / 2.000 kJ
 Grassi, di cui: - saturi 280 kcal / 280 kJ
 - acido linoleico 20 g
 - acido alfa-linolenico 3,4 g
 Carboidrati, di cui: - zuccheri 62 g
 Proteine 12 g
 Sali 0,37 g
 Vitamina A (RE) 460 mcg
 Vitamina D 7,5 mcg
 Vitamina E (alfa-TE) 5,5 mg
 Vitamina K 62 mcg
 Vitamina C 75 mg
 Tiamina 0,53 mg
 Riboflavina 0,86 mg
 Niacina (NE) 7,4 mg
 Vitamina B6 0,74 mg
 Acido folico 70 mcg
 Vitamina B12 1,1 mcg
 Biotina 10,6 mcg
 Acido pantotenico 3,2 mg
 Sodio 149 mg
 Potassio 590 mg
 Cloruri 340 mg
 Calcio 620 mg
 Fosforo 360 mg
 Magnesio 48 mg
 Ferro 8 mg
 Zinco 5,3 mg
 Rame 0,36 mg
 Manganese 0,144 mg
 Selenio 12 mcg
 Cromo 21 mcg
 Molibdeno 26 mcg
 Iodio 84 mcg
 Osmolarità 380 mOsm/l

Acido arachidonico (ARA) 163 mg
 Acido docosaesaenoico (DHA) 82 mg
 Colina 115 mg
 Inositolo 82 mg
 L-carnitina 10,6 mg
 Taurina 29 mg

Modalità d'uso

- 1) Lavarsi accuratamente le mani. Lavare e far bollire in acqua per 1 minuto poppatoi, tettarelle, ghiere, tappi e utensili.
- 2) Far bollire altra acqua per 1 minuto e farla raffreddare a temperatura ambiente prima di iniziare la preparazione. Versare la giusta quantità d'acqua raffreddata nel poppatoio.
- 3) Aggiungere la giusta quantità di polvere all'acqua (vedi tabella di

alimentazione). Conservare il misurino asciutto nel barattolo. 4) Chiudere il poppatoio, ruotarlo prima tra le mani e poi agitarlo vigorosamente. Controllare la temperatura sulla parte interna del polso. Il prodotto dopo essere stato preparato, è soggetto ad un rapido deterioramento. Somministrare subito dopo la preparazione, altrimenti coprire il preparato e conservarlo in frigorifero ad una temperatura di 2-4°C per non oltre 24 ore. Non congelare la formula già preparata e non utilizzarla qualora sia rimasta fuori dal frigorifero per oltre 2 ore. Usare il preparato che è stato a contatto con la bocca del lattante entro 1 ora e non riporre il biberon in frigorifero. Buttare via l'eventuale prodotto residuo nel biberon e pulire con cura gli utensili. Non utilizzare forni a microonde per riscaldare il preparato. Tabella di alimentazione: per le giuste quantità di acqua bollita e di polvere, seguire le istruzioni sotto riportate, salvo diversa indicazione del pediatra.

Età	N° pasti nelle 24 ore	Acqua (ml)	Misurini*	Prodotto pronto per l'uso (ml)
6-12 mesi	2-3	210	7230	>1 anno
>1 anno	2	210	7230	

*Usare solo il misurino incluso nel barattolo per misurare la polvere. Un misurino raso e non compresso (4,7 g) si aggiunge ad ogni 30 ml di acqua. Avvertenze Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante. Se l'allattamento al seno non è possibile, Nutramigen 2 LGG è indicato per il regime alimentare di lattanti con allergia alle proteine del latte vaccino e deve essere impiegato sotto il controllo del pediatra. Nutramigen 2 LGG è adatto all'alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese di vita e può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Il prodotto può frequentemente indurre feci molli di colorazione verdastria. Per la salute del bambino, si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni per la preparazione e l'uso del prodotto. L'igiene, la preparazione, la diluizione, l'uso e la conservazione eseguiti correttamente sono importanti durante la preparazione del biberon. Gli alimenti in polvere per lattanti non sono sterili. Il medico valuterà l'utilizzo del prodotto nei casi appropriati. L'inosservanza delle presenti istruzioni può nuocere gravemente alla salute. Non somministrare per via parenterale. Conservazione Conservare il barattolo in luogo fresco ed asciutto. Chiudere bene la confezione dopo averla utilizzata, conservarla in luogo asciutto ed utilizzare il contenuto entro un mese dalla prima apertura. Non congelare la polvere. Evitare l'esposizione a fonti di calore. Validità a confezionamento integro: 15 mesi. Validità post-apertura: 1 mese. Formato Barattolo da 400 g. Cod. 1270067