

PEGINPOL MACROGOL 3350 SOSPENSIONE ORALE 20 BUSTINE

Marchio: -
Codice Min.: 975459532
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PEGinpol Descrizione PEGinpol è un dispositivo medico appartenente alla classe 2A, ad azione lassativa che, attraverso un meccanismo di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. PEGinpol è particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua, PEGinpol ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi, né dolore

addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. Ingredienti Macrogol 3350; eccipienti: biossido di silicio, aroma, saccarina sodica. Senza glutine e lattosio. Modalità d'uso Da 6 mesi a 2 anni (fino a 12 kg): 1-2 bustine al giorno. Da 2 a 11 anni (da 12 kg a 20 kg): 2-4 bustine al giorno. Al di sopra di 11 anni (o > 20 kg): 2-6 bustine al giorno. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico per la posologia più corretta. Utilizzare il prodotto in età pediatrica solo dopo consiglio medico. Normalmente il dosaggio massimo necessario non supera le 6 bustine al giorno. Sciogliere una busta (5 g) in circa 1/2 bicchiere d'acqua (circa 62,5 ml). È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. Si consiglia di assumere PEGinpol lontano dai pasti. Avvertenze La sospensione orale deve essere preparata al momento dell'assunzione. Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l'insorgenza di effetti collaterali inaspettati. Non usare PEGinpol per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico. Non assumere in caso di intolleranza al prodotto. Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti ed al Polietilenglicole. Non utilizzare in bambini al di sotto dei 6 mesi. Durante il trattamento con PEGinpol è consigliabile seguire una dieta adeguata accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione; si consiglia comunque di consultare il medico. Non utilizzare PEGinpol dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non assumere in caso di busta danneggiata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e rivolgersi immediatamente al proprio medico o farmacista. In caso di mancata assunzione non assumere una dose doppia, ma aspettare e assumere la dose successiva. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura non superiore a 25°C, nella confezione originale. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 20 bustine da 5 g ciascuna. Peso netto: 100 g. Cod. 3066