

PIROXICAM (DOC)*crema derm 50 g 1%

Marchio: DOC GENERICI SRL
Codice Min.: 034859025
Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONEPIROXICAM DOC 1% CREMA**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**Farmaci per uso topico per dolori articolari muscolari.**PRINCIPI ATTIVI**100 g di crema contengono 1 g di piroxicam. **Eccipienti con effetti noti:** glicole propilenico, alcool cetostearilico. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.**ECCIPIENTI**Polietilenglicole 1000 monocetiletere, glicole propilenico, alcool cetostearilico, alcool feniletilico, profumo anallergico, esteri poliglicolici di acidi grassi, acqua depurata.**INDICAZIONI**Stati dolorosi di natura reumatica, flogistica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti (artriti, periartriti, artrosi a varia localizzazione in fase di riacutizzazione, sinoviti, tendiniti, tenosinoviti, borsiti, contusioni, distorsioni, stiramenti, postumi di lussazioni, mialgie, brachialgie, lombalgia, torcicollo).**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo od ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Il piroxicam e' controindicato in casodi gravidanza, accertata o presunta, e di allattamento.**POSOLOGIA**Spalmare 2-3 centimetri di crema sulla parte dolorante massaggiando lentamente fino a completo assorbimento, ripetendo la somministrazione 2-3 o piu' volte al giorno.**CONSERVAZIONE**Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.**AVVERTENZE**Vedere paragrafi 4.5 e 4.6. Con piroxicam sono stati segnalati casi di eruzione fissa da farmaci (FDE). Piroxicam non deve essere reintrodotta in pazienti con anamnesi di FDE correlata a piroxicam. Potrebbe verificarsi una potenziale reazione crociata con altri oxicam. **PIROXICAM DOC** contiene glicole propilenico: questo medicinale contiene 7 g di propilene glicole per 100 g. Puo' causare irritazione della pelle. Da tenere in considerazione se usato su ferite aperte o aree estese di pelle danneggiata (come bruciate). **PIROXICAM DOC** contiene alcool cetostearilico: questo medicinale contiene alcool cetostearilico che puo' causare reazioni sulla pelle localizzate (ad esempio dermatiti da contatto). **PIROXICAM DOC** contiene allergeni: questo medicinale contiene un aroma a sua volta contenente gli allergeni cumarina, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, linalolo, benzil benzoato,citronello. Tali allergeni possono causare reazioni allergiche.**INTERAZIONI**In base agli studi di biodisponibilita' e' estremamente improbabile che il piroxicam crema spiazzi altri farmaci legati alle proteine plasmatiche. Tuttavia i medici dovranno tenere sotto controllo i pazienti trattati con **PIROXICAM DOC** crema e farmaci ad alto legame proteico per eventuali aggiustamenti dei dosaggi.**EFFETTI INDESIDERATI**L'uso del prodotto, specie se prolungato, puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione od irritazione locale. In tal caso occorre interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea. Effetti con frequenza non nota: eruzione fissa da farmaci (vedere paragrafo 4.4). Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
II piroxicam e' controindicato in caso di gravidanza, accertata o presunta, e di allattamento.