

PROCTEN CREMA 40 ML

Marchio: -
Codice Min.: 927304473
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PROCTEN CREMA Descrizione Crema per uso topico nel trattamento di proctiti, ragadi, emorroidi. Previene e cura proctiti e tenesmo da radioterapia ano-rettale. Agisce su infiammazione, dolore, gonfiore e prurito. Esercita un'azione lubrificante e protettiva, stimola la rigenerazione tissutale della mucosa e la riepitelizzazione. È la valida alternativa ai farmaci steroidei, non steroidei, ai disinfettanti e agli antibiotici locali. Non ha controindicazioni e non da problemi di sovradosaggio. Non essendo un farmaco può essere utilizzato da tutti: bambini, adulti, anziani, categorie di pazienti a rischio, donne in gravidanza, pazienti radioterapici. Azione antinfiammatoria-antipruriginosa: inattiva le ciclo-lipo-ossigenasi (COX-2) riducendo le prostaglandine responsabili del dolore e delle dema e attiva le amminossidasi (MAO e DAO) che degradano istamina e serotonina causa dei fenomeni di rossore e

prurito. Induce la rigenerazione e riparazione tissutale: stimola la sintesi di fibroblasti, collagene, nuovi vasi agendo sui fattori di crescita FGF, PDGF, EGF, VEGF, HIF-1alfa. Promuove l'adesione cellulare nella formazione di nuovo tessuto perchè stimola la trascrizione delle e-caderine. Modalità d'uso Pulire meticolosamente l'area affetta con idrozoil diluito in acqua e asciugare. In caso di proctiti: avvitare sul tubo l'apposita cannula endorettale ed applicare sull'area colpita la sera, la mattina e dopo ogni evacuazione fino alla normalizzazione della situazione. In caso di ragadi ed emorroidi: stendere una piccola quantità di prodotto direttamente sulla parte interessata. il periodo di trattamento è variabile in relazione alla rapidità della risposta terapeutica. Componenti Ozoile (ozonidi stabili con vitamina e acetato), cera alba, acido glicirretico, acido ialuronico, ribes nero, arginina. Conservazione Conservare al riparo dalla luce, in un luogo fresco e asciutto. Validità a confezionamento integro: 48 mesi. Validità post-apertura: 6 mesi. Formato Tubetto da 40 ml. Cod. 0488