

## SALONPAS FLESSIBILE\*5 empiastri in bustina 105 mg + 31,5 mg7 x 10 cm

**Marchio:** SALONPAS  
**Codice Min.:** 042979029  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE** SALONPAS FLESSIBILE, 105 MG/31,5 MG, EMPIASTRO MEDICATO SALICILATO DIMETILE / LEVOMENTOLO **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari. **PRINCIPI ATTIVI** Ogni empiastro medicato contiene salicilato di metile al 10% (105 mg) e levomentolo al 3% (31,5 mg). **ECCIPIENTI** Resina di idrocarburi aliciclici saturi Paraffina liquida Poli-isobutilene Copolimero a blocchi stirene-isoprene-stirene Silicato di alluminio sintetico Matrice di supporto Pellicola in plastica **INDICAZIONI** Trattamento sintomatico dei dolori muscolari e articolari associati a strappi muscolari e distorsioni. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** Ipersensibilità al principio attivo, ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Lo empiastro medicato non deve essere usato nei seguenti casi: pazienti nei quali sostanze con simile meccanismo d'azione (p.es. acido acetilsalicilico o FANS) causano attacchi d'asma, broncospasmo o rinite acuta oppure polipinasi, orticaria o angioedema; grave insufficienza cardiaca; grave disfunzione epatica o renale; sanguinamento gastrointestinale o sanguinamento attivo di altro tipo o disturbi della coagulazione; terzo trimestre di gravidanza. Il cerotto non deve essere usato su ferite aperte o aree cutanee interessate da alterazioni patologiche, come eczema, acne, dermatite, infiammazione o infezione di qualsiasi tipo, o sulla membrana mucosa degli orifici corporei e non deve entrare a contatto con gli occhi. **POSOLOGIA** Applicare un cerotto sull'area interessata e lasciare in sede per un massimo di 8-12 ore. Se dopo 8-12 ore dall'applicazione del primo cerotto il dolore ricompare, è possibile applicare un secondo cerotto. Usare un solo cerotto alla volta. Non usare più di 2 cerotti al giorno. Non usare per oltre 3 giorni consecutivi. **Popolazione pediatrica.** L'uso del medicinale non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni poiché non vi sono dati sufficienti sulla sicurezza ed efficacia. **CONSERVAZIONE** Conservare il medicinale a temperatura inferiore a 25°C e nella confezione originale per proteggerlo dalla luce. Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, risigillare accuratamente il lato aperto della bustina per proteggere i cerotti rimasti. **AVVERTENZE** Farmaci analgesici, antipiretici e antinfiammatori non steroidei (FANS) possono provocare reazioni di ipersensibilità potenzialmente serie, tra cui reazioni anafilattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questi tipi di farmaci. La biodisponibilità sistemica dei principi attivi applicati per via transdermica è significativamente inferiore a quella associata a somministrazione orale. Tuttavia, non è possibile escludere completamente l'insorgenza di effetti indesiderati sistemici. Somministrare con cautela ai pazienti con allergie o storia di allergie. I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere attentamente monitorati per l'insorgenza di disturbi digestivi, in particolare sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi di sanguinamento gastrointestinale o ulcera associati al trattamento con salicilato di metile o levomentolo, il trattamento deve essere interrotto immediatamente. L'uso del medicinale non è raccomandato nei pazienti con ulcera gastrointestinale in fase attiva o sospetta o pregressa o dispepsia cronica. L'uso del farmaco non è

raccomandato nei pazienti con storia di asma bronchiale. Popolazione pediatrica. L'uso del medicinale non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni poiché non vi sono dati sufficienti sulla sua sicurezza ed efficacia. L'uso prolungato o ripetuto del prodotto può provocare sensibilizzazione. Il trattamento deve essere interrotto se si manifestano reazioni di ipersensibilità.

**INTERAZIONI** La bassa biodisponibilità sistemica dei principi attivi del medicinale indica che l'interazione con altri medicinali è improbabile. Benché non siano stati effettuati studi di interazione adeguatamente controllati, una rassegna della letteratura sembra suggerire che l'uso eccessivo di salicilati per uso topico può aumentare l'effetto degli anticoagulanti cumarinici. Pertanto è consigliabile usare prudenza con i pazienti in terapia con anticoagulanti cumarinici come warfarin. I farmaci revulsivi (anti-irritanti) e gli analgesici agiscono sinergicamente.

**EFFETTI INDESIDERATI** Sono state segnalate reazioni cutanee localizzate come eritema, dolore, prurito, calore, eruzioni e alterazioni del colore della pelle. Sono state anche riportate ustioni nella sede di applicazione (frequenza: non nota). L'uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può provocare fenomeni di ipersensibilità. In tal caso, è necessario interrompere il trattamento e istituire un'adeguata terapia alternativa. Negli studi clinici sul medicinale non si sono verificate reazioni avverse serie. Negli studi clinici, 639 pazienti sono stati trattati con il farmaco. Di seguito sono riportate le reazioni avverse al farmaco. I seguenti effetti indesiderati sono risultati correlati al trattamento e sono stati classificati in base alla seguente convenzione: molto comune ( $\geq 1/10$ ); comune ( $\geq 1/100$ ,  $= 1/1.000$ ,  $= 1/10.000$ ).

**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Gravidanza. Durante il primo e il secondo trimestre: la sicurezza del medicinale nelle donne in gravidanza non è stata stabilita. Pertanto, nel primo e nel secondo trimestre di gravidanza occorre evitare l'uso del medicinale. Durante il terzo trimestre: il farmaco è controindicato durante l'ultimo trimestre di gravidanza. Allattamento. Non è noto se la somministrazione cutanea di salicilato di metile potrebbe determinare un assorbimento sistemico sufficiente a evidenziare la presenza di quantità rilevabili di salicilato di metile nel latte materno. Si deve decidere se continuare/interrompere l'allattamento o continuare/interrompere la terapia con il farmaco tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia con il medicinale per la donna.

**Fertilità**. Non esistono segnalazioni sugli effetti del farmaco sulla fertilità. Tuttavia, poiché l'uso di salicilato di metile può compromettere la fertilità femminile, si sconsiglia l'uso del prodotto alle donne che cercano una gravidanza.