

## SANIPEG MACROGOL POLVERE PER SOLUZIONE ORALE BARATTOLO 300 G

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 933330957  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**SANIPEG MacroGol** Trattamento sintomatico della stipsi  
**Descrizione** Trattamento sintomatico della stipsi. Favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza prevenendo la formazione di fecalomi. Il macrogol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci. Determina una reidratazione ed un ammorbidimento della massa fecale e ne facilita l'evacuazione. Accelera il transito intestinale favorendo la peristalsi. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastro-intestinale e non porta a squilibri idro-elettrolitici, se assunto con la dose indicata di liquido. **Composizione** MacroGol, sucralosio. **Modalità d'uso** Il misurino deve essere riempito raso e non pressato, togliendo la polvere in eccesso con la lama di un

coltello. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione. Il misurino deve essere utilizzato solo al fine di dosare la polvere. **Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni:** da 2 a 10 misurini rasi al giorno. La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda delle risposte individuali al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente i 10 misurini al giorno. Sciogliere la polvere in acqua od altro liquido (50 ml per ogni misurino) ed assumere immediatamente. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (2 misurini al giorno). Per dosi maggiori suddividere tra mattino e sera. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico. **Bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni:** la dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente i 4 misurini al giorno. Sciogliere la polvere in acqua od altro liquido (50 ml per ogni misurino) ed assumere immediatamente. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere 1 misurino al giorno. Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera. In mancanza di ripristino della fisiologica regolarità intestinale dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico. **Avvertenze** Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. **Conservazione** Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. **Formato** Barattolo contenente 300g di polvere per soluzione orale con misurino.