

SEBIPROX*shampoo 100 ml 1,5%

Marchio: SEBIPROX
Codice Min.: 035446020
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE SEBIPROX 1,5% SHAMPOO **CATEGORIA** FARMACOTERAPEUTICA Antimicotico per uso dermatologico topico. **PRINCIPI ATTIVI** Ciclopirox olamina 1,50 g (1,5% w/w) per 100 g di shampoo. **ECCIPIENTI** Sodio lauril etere solfato 70%, cocamidopropil betaina, disodio fosfato dodecaidrato, acido citrico monoidrato (correttore del pH), dietanolamide (DEA) di noce di cocco, glicole esilenico, alcool oleilico, polisorbato-80, poliquaternium-10, fragranza AF17050 (contenente glicole dipropilenico), idrossido di sodio (correttore del pH), acqua depurata. **INDICAZIONI** Trattamento della dermatite seborroica del cuoio capelluto. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' alla ciclopirox olamina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Solo per uso cutaneo.

Questo farmaco all'1,5% di ciclopirox olamina deve essere utilizzato due o tre volte alla settimana. Applicare una quantita' sufficiente di shampoo sui capelli bagnati e massaggiare fino a formare una schiuma abbondante, quindi frizionare energicamente il cuoio capelluto e le aree adiacenti con la punta delle dita ed infine sciacquare accuratamente. Ripetere dall'inizio, tenendo presente che il prodotto deve restare a contatto con il cuoio capelluto per 3-5 minuti in totale nel corso delle 2 applicazioni. Il periodo di trattamento raccomandato e' di 4 settimane. Si puo' impiegare uno shampoo delicato fra due distinte applicazioni di questo medicinale all'1,5% di ciclopirox olamina. **Popolazione pediatrica:** nei bambini di eta' inferiore ai 12 anni non sono state stabilite sicurezza ed efficacia di questo farmaco all'1,5% di ciclopirox olamina. Non ci sono dati a disposizione. **CONSERVAZIONE** Nessuna speciale precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** Questo farmaco all'1,5% di ciclopirox olamina e' indicato solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Questo medicinale puo' causare irritazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi sciacquare con acqua. Questo medicinale all'1,5% di ciclopirox olamina puo' causare irritazione cutanea. In caso di irritazione persistente, il trattamento deve essere interrotto. In rari casi, prevalentemente in pazienti con capelli chimicamente danneggiati (per esempio, in caso di tintura per capelli), capelli grigi o bianchi, e' stata osservata la decolorazione dei capelli. **Informazioni importanti su alcuni eccipienti:** questo farmaco contiene 9 mg di alcol benzilico per 100g di shampoo. L'alcol benzilico puo' causare reazioni allergiche e lieve irritazione locale. Questo medicinale contiene una fragranza, che a sua volta contiene i seguenti allergeni: linalolo, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, citronellolo, aldeide exil cinnamica, benzil salicilato, benzil benzoato, cumarina, eugenolo, geraniolo, idrossicitronellale, isoeugenolo, lilliale, d-limonene, alcool benzilico, amile cinnamale, alcool amilcinnamilico, alcool anisilico, benzil cinnamato, cinnamale, alcool cinnamilico, citrale e farnesolo che possono causare reazioni allergiche. In aggiunta alle reazioni allergiche in pazienti sensibilizzati, i pazienti non-sensibilizzati possono diventarlo. **INTERAZIONI** Non ci

sono dati disponibili sulle interazioni farmacologiche. E' comunque improbabile il manifestarsi di tali interazioni, considerato il basso livello di assorbimento sistemico.

EFFETTI INDESIDERATI

Le reazioni avverse da studi clinici e nell'esperienza post-marketing sono rappresentate di seguito. Le reazioni avverse sono classificate per classe sistemica, d'organo e di frequenza, utilizzando la seguente convenzione: molto comune ($\geq 1/10$), comune ($\geq 1/100$, $= 1/1.000$ a $= 1/10.000$ a

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Gravidanza: non sono disponibili dati sull'uso di ciclopirox olamina nelle donne in gravidanza. Studi sull'uso di ciclopirox olamina negli animali non suggeriscono alcun effetto nocivo diretto o indiretto in relazione alla tossicità riproduttiva. Tuttavia, non ci sono dati sufficienti sui possibili effetti a lungo termine sullo sviluppo post-natale. A scopo precauzionale, e' preferibile evitare l'uso di ciclopirox olamina shampoo durante la gravidanza.

Allattamento: non e' noto se ciclopirox olamina sia escreto nel latte materno. Pertanto, le donne che allattano al seno non devono usare ciclopirox olamina shampoo.

Fertilità: gli studi sugli animali cui sia stato somministrato ciclopirox olamina per via orale o sottocutanea, non hanno rivelato alcuna compromissione della fertilità'.