

SINOPOL FORTE 30 BUSTINE DA 3,7G

Marchio: LABOREST ITALIA
Codice Min.: 939000360
Link: [clicca qui per acquistare](#)



SINOPOL FORTE Descrizione Integratore alimentare che contribuisce alla normale fertilità e riproduzione. Integratori alimentari per il mantenimento dei livelli normali di glucosio nel sangue e per il metabolismo dei carboidrati. Integratore alimentare a base di mioinositolo, acido alfa-lipoico, estratto di mele e acido folico. La mela contribuisce alla modulazione dell'assorbimento dei nutrienti. L'Acido folico contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza. Ingredienti Mioinositolo, acido alfa-lipoico ricoperto; agente di carica: sorbitolo; stabilizzanti: gomma di xantano, farina di semi di guar; SelectSIEVE Apple (Malus domestica Borkh., frutto e.s.); agenti antiagglomeranti: talco, biossido di silicio; aromi, maltodestrine; colorante:

rosso di radice di barbabietola, betanina; agente di rivestimento: gommalacca; edulcorante: sucralosio; umettante: glicerolo; acido folico (acido pteroil-monoglutammico). Senza glutine e lattosio. Caratteristiche nutrizionali Valori medi Per 2 bustine %VNR* Mioinositolo 4000 mg - Acido Alfa-Lipoico 800 mg - SelectSIEVE Apple 300 mg - Acido Folico 400 mcg 200* Valori nutritivi di riferimento giornaliero per vitamine e sali minerali (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011 Modalità d'uso Si consiglia di assumere 2 bustine di Sinopol Forte al giorno, preferibilmente lontano dal pasto. Le due assunzioni giornaliere devono essere possibilmente intervallate da circa 10 ore. Il prodotto si avvale di una particolare tecnologia che produce microgranuli dispersibili e non solubili; pertanto, versato il contenuto della bustina in un bicchiere d'acqua, si consiglia di mescolare fino a ottenere una miscela omogenea. Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno sano stile di vita. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia. Presenza di solfiti. Conservazione Conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C); evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato 30 bustine da 3,7 g. Peso netto: 111 g.