

SOLUZIONE OFTALMICA OFTAIAL PLUS ACIDO IALURONICO 0,4% E TAURINA 10ML

Marchio: OFTAIAL
Codice Min.: 935952958
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Oftaial Plus Composizione 100 ml di soluzione contengono: sodio ialuronato (0,4 g), taurina (0,5 g), sodio cloruro, magnesio cloruro, potassio cloruro, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bifasico, acqua per preparazione iniettabile. Che cos'è Il prodotto è una soluzione oftalmica. Perché si usa Oftaial Plus è una soluzione ipotonica destinata all'instillazione sulla superficie oculare o sulle lenti a contatto, in particolar modo in presenza della sintomatologia da "occhio secco". Grazie all'alto concentrato di sodio ialuronato (0,4%) ed alla presenza di sali come magnesio a potassio, il prodotto umidifica e lubrifica la superficie oculare e riduce il rischio di instabilità dal film lacrimale. Inoltre, la peculiarità della composizione del prodotto consiste nella presenza di taurina, l'amminoacido fisiologicamente più abbondante nel fluido lacrimale ed in generale in tutti i tessuti del segmento

anteriore dell'occhio. Diversi studi dimostrano che la presenza di taurina, aumenta la percentuale di cellule che sopravvivono in condizioni di iperosmolarità. L'iperosmolarità, a livello del film lacrimale, è associata all'insorgenza della sintomatologia da "occhio secco". Pertanto il prodotto, pur non avendo un effetto farmacologico, protegge l'epitelio corneale dai possibili danni causati da particolari condizioni che possono provocare l'insorgenza del cosiddetto "occhio secco", come ad esempio: - condizioni climatiche e ambientali avverse quali vento, freddo, sole, salsedine, aria condizionata, fumo, smog o polveri sottili; - condizioni particolari di stress oftalmico dovuto all'uso di lenti a contatto o a prolungato lavoro ai videoterminali o al microscopio. L'azione lubrificante è utile altresì quando, in particolari condizioni fisiche o a seguito dell'assunzione di alcuni farmaci, si riduce la lacrimazione come ad esempio in menopausa e durante la cura del diabete. Inoltre, nei portatori di lenti a contatto, il prodotto permette di lubrificare ed idratare la lente stessa per facilitarne l'applicazione o la rimozione, contribuendo ad una sensazione di comfort durante la giornata. Quando non deve essere usato l'ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Precauzioni per l'uso Il prodotto è solo per uso esterno. Il prodotto non dovrebbe essere impiegato subito prima della somministrazione di medicinali a scopo curativo, e nei dieci minuti dopo l'applicazione di una eventuale terapia farmacologica per via topica. Per ridurre il rischio di contaminazione, ciascun flacone deve essere utilizzato da una sola persona. Evitare che la punta del contagocce venga a contatto diretto con le dita, con l'occhio, con la lente a contatto o con qualsiasi altra superficie. Evitare inoltre che il contagocce entri a contatto con sporcizia o polvere. Con quale frequenza e per quanto tempo dovrebbe essere utilizzato Oftaial Plus dovrebbe essere dosato individualmente secondo il proprio stato ed in base alle raccomandazioni del proprio medico oculista. In generale, instillare 1-2 gocce della soluzione nel sacco congiuntivale di ciascun occhio al momento del bisogno, anche più volte al giorno. Per

l'impiego sulle lenti a contatto: instillare una goccia su ogni lente al momento dell'applicazione o della rimozione. Ripetere in caso di necessità, anche più volte al giorno. Come si applica Oftaial Plus Aprire il flacone muovendo la linguetta di protezione. Rimuovere il tappo. Premendo sul flacone capovolto, instillare 1-2 gocce di prodotto nel sacco congiuntivale di ciascun occhio, lasciandole cadere dall'alto. Richiudere sempre il flacone con il suo tappo dopo l'utilizzo. Non danneggiare o smontare il flacone e non danneggiare o bloccare meccanicamente l'orifizio del contagocce. Per l'impiego delle lenti a contatto: instillare una goccia di prodotto nella cavità di ciascuna lente al momento dell'applicazione o della rimozione. Effetti indesiderati In rari casi si è osservato un leggero offuscamento della vista all'instillazione, che è dovuto alla densità della soluzione. Tale sensazione, tuttavia, scompare molto rapidamente. È possibile il verificarsi, in qualche raro caso, di intolleranza (sensazione di bruciore e/o irritazione), comunque priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Si consiglia, comunque, di contattare il proprio medico oculista nel caso del protrarsi dei sintomi. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Scadenza e conservazione Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C. La soluzione deve essere utilizzata entro 8 settimane dalla prima apertura del flacone. Dopo tale periodo eliminare l'eventuale residuo. Attenzione Non utilizzare la soluzione dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto se il flacone è danneggiato. Non premere il flacone se è chiuso con tappo. Formato 10 ml