

## SOLUZIONE OFTALMICA OPTIVE ADVANCE

**Marchio:** OPTIVE  
**Codice Min.:** 980926202  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Optive Advance Descrizione Soluzione multidose sterile senza conservanti contenente carbossimetilcellulosa sodica 0,5%, glicerina 0,9%, ialuronato di sodio 0,1%, acido borico, sodio borato decaidrato, sodio citrato diidrato, cloruro di potassio, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, eritritolo, levocarnitina, acqua purificata e sodio idrossido e/o acido cloridrico per regolare il pH. Componenti Carbossimetilcellulosa sodica 0,5%, glicerina 0,9%, ialuronato di sodio 0,1%, acido borico, sodio borato decaidrato, sodio citrato diidrato, cloruro di potassio, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, eritritolo, levocarnitina, acqua purificata e sodio idrossido e/o acido cloridrico per regolare il pH. Modalità d'uso Preparare il flacone per il primo utilizzo: 1) Rimuovere la copertura di protezione trasparente tirandola verso l'alto. Gettare via la copertura trasparente. Non utilizzare Optive

Advance se la copertura di protezione trasparente o la linguetta sono danneggiati o mancanti. 2) Rimuovere la linguetta dal tappo colorato tirando l'estremità della linguetta dal flacone e girandola in senso antiorario. Gettare la linguetta. 3) Rimuovere il tappo protettivo colorato tirandolo verso l'alto. Conservare il tappo colorato per l'utilizzo successivo. 4) Attivare il flacone per il primo utilizzo spremendo lentamente il flacone ed erogando una goccia su un tessuto. Familiarizzare con il tempo e la pressione necessari per l'erogazione di una goccia. Attendere alcuni secondi dopo aver spremuto per permettere alla goccia di uscire completamente. Assicurarsi di far rigonfiare il flacone tra un'erogazione e l'altra. Eseguire l'operazione due volte. Evitare che la punta del flacone tocchi il tessuto. 5) il flacone è ora pronto per essere utilizzato. Spremere delicatamente il flacone al centro e far cadere una goccia nell'occhio interessato. Si prega di notare che potrebbero esserci alcuni secondi di ritardo tra la pressione esercitata sul flacone e la comparsa di una goccia. Non spremere troppo il flacone. Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio secondo necessità. Una volta somministrato, lasciare che il flacone si rigonfi e quindi riposizionare il tappo protettivo colorato, spingendolo verso il basso. Si prega di notare che, se usato come indicato, potrebbe rimanere una piccola quantità di Optive Advance all'interno del flacone che potrebbe non essere erogata completamente. Avvertenze Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei componenti. Non ingerire la soluzione. Per evitare contaminazione o un possibile danno oculare, non appoggiare la punta del flacone su alcuna superficie ed evitare il diretto contatto con l'occhio. Non usare dopo la data di scadenza indicata sul prodotto. Non usare se la copertura di protezione o la linguetta sono danneggiati o mancanti. Non utilizzare se la soluzione cambia colore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lasciare passare 5 minuti tra la somministrazione di prodotti oftalmici. Gettare l'eventuale soluzione rimasta dopo 3 mesi dalla prima apertura. Interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico in caso di dolori oculari, modifiche della vista, persistente rossore o irritazione oculare, o se le condizioni peggiorano. Conservazione Conservare a temperatura ambiente.

Usare prima della data di scadenza indicata sulla confezione. Formato Flacone multidose da 10 ml. Cod. 96465IT