

STILLERGY*collirio 8 ml 0,05% + 0,3%

Marchio: STILLA
Codice Min.: 034450027
Link: [clicca qui per acquistare](#)

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Decongestionante ed antiallergico. **INDICAZIONI** Per il trattamento sintomatico degli episodi di irritazione e congestione della congiuntiva. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Glaucoma ad angolo chiuso. Questo prodotto contiene acido borico e non va somministrato ai bambini al di sotto dei 3 anni di eta'. Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento e nei bambini di eta' inferiore ai 12 anni. Nei soggetti affetti da glaucoma, altre malattie dell'occhio o con lesioni provocate da agenti meccanici, chimici, fisici (calore) o, comunque, quando sono presenti caratteristiche (quali, ad esempio, secrezione oculare o sensazione di corpo estraneo) diverse dal normale lieve disturbo facilmente riconoscibile dal soggetto (semplice arrossamento degli occhi) il prodotto deve essere usato solo dietro prescrizione medica. In generale, le lenti a contatto (specialmente quelle idrofiliche, morbide) non dovrebbero essere portate durante il trattamento con tutti i medicinali per uso oculare. **POSOLOGIA** Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale, 2-3 volte al giorno. Non usare per piu' di 3-4 giorni salvo diversa prescrizione del medico. **INTERAZIONI** Per il possibile assorbimento sistemico del medicinale non possono essere escluse interazioni con altri farmaci; in particolare, i soggetti in terapia con farmaci inibitori delle monoaminossidasi (anti-MAO) possono usare il medicinale solo dopo aver consultato il medico. **EFFETTI INDESIDERATI** Gli effetti indesiderati piu' comunemente riportati sono: annebbiamento della vista, irritazione congiuntivale, bruciore oculare, midriasi (dilatazione della pupilla). Occasionalmente: nausea, cefalea, ipertensione, debolezza, sudorazione, vertigini, palpitazioni, tremori, insonnia, aumento della pressione endoculare.