

TANTUM VERDE*collutorio 240 ml 0,15%

Marchio: TANTUM VERDE
Codice Min.: 022088076
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONETANTUM VERDE 0,15% COLLUTORIO**CATEGORIA**
FARMACOTERAPEUTICAStomatologici.**PRINCIPI ATTIVI**Benzidamina
cloridrato.**ECCIPIENTI**Glicerolo, etanolo (96%), saccarina, metile
paraidrossibenzoato, sodiobicarbonato, aroma menta, polisorbato 20, giallo chinolina
(E 104), blu patent V (E 131), acqua depurata.**INDICAZIONI**Trattamento sintomatico
di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es.
gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o
estrattiva.**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' alla benzidamina o
ad uno qualsiasi degli eccipientielencati.**POSOLOGIA**Versare nel bicchierino dosatore
15 ml da utilizzare, 2-3 volte al giorno, in forma pura o diluita (in questo caso
aggiungere nel bicchierino dosatore 15 ml d'acqua). Non superare le dosi

consigliate.**CONSERVAZIONE**Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di
conservazione.**AVVERTENZE**L'uso del prodotto, specie se prolungato, puo' dar luogo a fenomeni
disensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e istituire idonea terapia. In un numero limitato
di pazienti le ulcerazioni oro-faringee possono essere segno di patologie piu' gravi. L'uso della
benzidamina e' sconsigliato in pazienti con ipersensibilita' all'acido acetilsalicilico o ad altri FANS. Il
farmaco deve essere somministrato con cautela in soggetti che in passato hanno avuto episodi di asma
bronchiale, in quanto in questo tipo di pazienti potrebbero intervenire fenomeni di broncospasmo. Il
medicinale contiene paraidrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate). Per
chi svolge attivita' sportiva: l'uso di medicinali contenenti alcool etilico puo' determinare positivita' ai test
antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni
sportive.**INTERAZIONI**Non sono stati effettuati studi d'interazione.**EFFETTI INDESIDERATI**L'elenco
sottostante riporta gli effetti indesiderati classificati per sistemi e organi secondo MedDRA. Gli effetti
indesiderati sono elencati utilizzando le seguenti scale di frequenza: molto comune ($\geq 1/10$); comune
($\geq 1/100$, $= 1/1000$, $= 1/10.000$), **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Non vi sono dati relativi all'uso della
benzidamina in gravidanza o durante l'allattamento. Non e' stata studiata l'escrezione del prodotto nel
latte materno. Gli studi condotti su animali con riferimento agli effetti in gravidanza e durante
l'allattamento sono insufficienti e pertanto il rischio potenziale per l'uomo non puo' essere valutato.
Durante la gravidanza e l'allattamento il farmaco non dovrebbe essere usato.