

TANTUM VERDE* soluz mucosa orale 15 ml 0,3%

Marchio: TANTUM VERDE
Codice Min.: 022088088
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENOMINAZIONE TANTUM VERDE 0,30% SOLUZIONE PER MUCOSA ORALE **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA** Stomatologici, altre sostanze per il trattamento orale locale. **PRINCIPI ATTIVI** 100 ml contengono: benzidamina cloridrato 0,30 g (pari a 0,268 g di benzidamina). **ECCIPIENTI** Glicerolo, etanolo (96 per cento), saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato, aroma menta, olio di ricino 40 poliossidrilato idrogenato, acqua depurata. **INDICAZIONI** Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia d e n t a r i a c o n s e r v a t i v a o estrattiva. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI** ipersensibilita' alla benzidamina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Adulti: 2-4

nebulizzazioni 2-6 volte al di' (ogni nebulizzazione equivale a 0,17 ml di soluzione). Non superare le dosi consigliate. **CONSERVAZIONE** Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. **AVVERTENZE** L'uso del prodotto, specie se prolungato, puo' dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. In un numero limitato di pazienti le ulcerazioni oro-faringee possono essere segno di patologie piu' gravi. Pertanto, nel caso in cui i sintomi dovessero perdurare per piu' di tre giorni, il paziente deve rivolgersi al proprio medico o dentista a seconda delle necessita'. L'uso della benzidamina e' sconsigliato in pazienti con ipersensibilita' all'acido acetilsalicilico o ad altri FANS. Il farmaco deve essere somministrato con cautela in soggetti che in passato hanno avuto episodi di asma bronchiale, in quanto in questo tipo di pazienti potrebbero intervenire fenomeni di broncospasmo. Il medicinale contiene paraidrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate). Per chi svolge attivita' sportiva: l'uso di medicinali contenenti alcool etilico puo' determinare positivita' ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive. **INTERAZIONI** Non sono stati condotti studi di interazione con altri farmaci. **EFFETTI INDESIDERATI** All'interno di ciascuna classe di frequenza gli effetti indesiderati sono riportati in ordine decrescente di gravita'. Sono state utilizzate le seguenti scale di valori: molto comune ($\geq 1/10$); comune ($\geq 1/100$, $= 1/1000$, $= 1/10.000$), **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** Non vi sono dati relativi all'uso della benzidamina in gravidanza o durante l'allattamento. Non e' stata studiata l'escrezione del prodotto nel latte materno. Gli studi condotti su animali con riferimento agli effetti in gravidanza e durante l'allattamento sono insufficienti e pertanto il rischio potenziale per l'uomo non puo' essere valutato. Durante la gravidanza e l'allattamento il farmaco non dovrebbe essere usato.