

## TEGENS\*20 bust grat 160 mg

**Marchio:** TEGENS  
**Codice Min.:** 023539075  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DENOMINAZIONE TEGENS CATEGORIA**  
FARMACOTERAPEUTICA Vasoprotettori, sostanze capillaroprotettrici, bioflavonoidi. **PRINCIPI ATTIVI** 160 mg capsule rigide. Ogni capsula contiene: complesso antocianosidico del mirtillo al 36% di antocianosidi (Myrtocyan) 160 mg. 160 mg granulato per soluzione orale. Ogni bustina contiene: complesso antocianosidico del mirtillo al 36% di antocianosidi (Myrtocyan) 160 mg. **ECCIPIENTI** Capsule rigide: mannitolo, lattosio, metilcellulosa, acido citrico, silice precipitata, magnesio stearato, gelatina (eccipiente dell'involucro). Granulato per soluzione orale: mannitolo, lattosio monoidrato,

metilcellulosa, acido citrico anidro, mirtillo aroma, ammonio glicirizzato. **INDICAZIONI** Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilita' capillare. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. **POSOLOGIA** Adulti: capsule o bustine di granulato: 1-2 al giorno. E' opportuno assumere questo medicinale al mattino e alla sera, con intervalli di 12-24 ore. Non superare le dosi consigliate. Popolazione pediatrica. L'uso del prodotto e' riservato agli adulti. **Modo di somministrazione.** Il granulato, da assumere come tale o sciolto in poca acqua, e' consigliato in soggetti con difficolta' della deglutizione e in condizioni di irritabilita' della mucosa gastrica da processi gastrico-ulcerosi. **CONSERVAZIONE** Capsule rigide: conservare a temperatura non superiore a 30 gradi C. Granulato per soluzione orale: nessuna speciale precauzione per la conservazione. **AVVERTENZE** Come per tutti i trattamenti sintomatici e' necessario rivolgersi al proprio medico curante qualora i sintomi non migliorassero dopo breve periodo di trattamento. L'impiego clinico non ha messo in evidenza la necessita' di particolari cautele per l'uso del farmaco. Questo medicinale contiene lattosio: i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di lattasi, o da malassorbimento di glucosio galattosio, non devono assumere questo medicinale. Popolazione pediatrica. L'uso del prodotto e' riservato agli adulti. **INTERAZIONI** Non sono mai stati segnalati fenomeni riferibili a interazioni con altre sostanze. **EFFETTI INDESIDERATI** Presenta ottima tollerabilita'. Sono stati segnalati rari casi di disturbi gastrointestinali, quali bruciori di stomaco, nausea e senso di pesantezza gastrica, ed eritemi cutanei. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione. **GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO** La sicurezza del farmaco in gravidanza non e' stata determinata, pertanto e' opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza. Nell'allattamento il prodotto va usato nei casi di effettiva necessita' sotto il diretto controllo del medico.