

## TRANSVERSAL\*16 cerotti 12 mm 13,5 mg

**Marchio:** TRANSVERSAL  
**Codice Min.:** 034674022  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**INDICAZIONI** Per il trattamento di verruche comuni, callosita' e duroni. **CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad un qualsiasi degli eccipienti. Il prodotto non dovrebbe essere usato in caso di diabete o di insufficienza circolatoria. Come tutti i prodotti ad alto contenuto di acido salicilico, non va applicato sul viso, sulla zona ano-genitale e sulle mucose. Il cerotto transdermico non va applicato su nevi, verrucheseborroiche e condilomi. Durante la gravidanza e l'allattamento non sono previste limitazioni d'impiego. **USO/VIA DI SOMMINISTRAZIONE**Altro preparato dermatologico. **POSOLOGIA**Applicare un cerotto transdermico sulla zona interessata alla sera e rimuoverlo il mattino seguente. Ripetere l'applicazione ogni 24 ore, fino alla eliminazione della verruca. Non superare le dosi consigliate. **INTERAZIONI**Evitare l'uso contemporaneo di altri cheratolitici per non aumentare l'azione caustica della sostanza attiva. **EFFETTI INDESIDERATI**E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore od irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. L'impiego, specie prolungato, di prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento ed istituire una idonea terapia. Non usare per trattamenti prolungati, dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Evitare l'applicazione sulla cute sana circostante la parte interessata. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Non usare il prodotto su pelle irritata, infetta od arrossata. Non ingerire. Il prodotto non deve essere impiegato per prevenire la formazione di verruche.