

VEROLAX*AD 6 contenitori monodose 6,75 g soluz rett

Marchio: VEROLAX
Codice Min.: 026525055
Link: [clicca qui per acquistare](#)



D E N O M I N A Z I O N E VEROLAX **C A T E G O R I A**
F A R M A C O T E R A P E U T I C A Farmaci per la costipazione. **P R I N C I P I**
A T T I V I Adulti Soluzione Rettale. 6 contenitori monodose 9 G: glicerina
6,75 g. Bambini Soluzione Rettale. 6 Contenitori Monodose 3 G: glicerina
2,25 g. Adulti Supposte: glicerina 2,25 g. Bambini Supposte: glicerina
1,375 g. Lattanti Supposte: glicerina 0,675 g. **E C C I P I E N T I** Soluzione
rettale. Adulti e Bambini: malva estratto fluido; camomilla estratto fluido;
amido di frumento; acqua depurata. Supposte Adulti, Bambini, Lattanti:
s o d i o s t e a r a t o , s o d i o
carbonato. **I N D I C A Z I O N I** Stitichezza. **C O N T R O I N D I C A Z I O N I / E F F . S E C O N**
D A R I persensibilita' individuale accertata verso il prodotto. Afezioni ano-

rettali, rettocolite emorragica e infiammazione delle emorroidi. **P O S O L O G I A** Soluzione rettale: 1 o 2
contenitori monodose nelle 24 ore. In caso distipsi ostinata si possono introdurre nel retto non piu' di 2
dosi contemporaneamente. Supposte: 1 supposta al bisogno. Non superare le dosi
consigliate. **C O N S E R V A Z I O N E** Nessuna speciale precauzione per la conservazione. **A V V E R T E N Z E** L'
uso continuo dei lassativi puo' provocare assuefazione o danno di diverso tipo. Non usare lassativi se
sono presenti dolori addominali, nausea e vomito. Se la costipazione e' ostinata consultare il
medico. **I N T E R A Z I O N I** Non sono state riscontrate interazioni con altri farmaci. **E F F E T T I**
I N D E S I D E R A T I Gli unici effetti che possono riscontrarsi sono di tipo irritativo, alivello dell' area rettale. Si
tratta solitamente di forme lievi, chenon richiedono l' intervento del medico. **G R A V I D A N Z A E**
A L L A T T A M E N T O Sulla base delle sue proprieta' chimico-fisiche, la glicerina per viarettale puo' essere
utilmente impiegata durante la gravidanza o il puerperio.