

XANAGEL GEL 40ML

Marchio: -

Codice Min.: 939558108

Link: clicca qui per acquistare



Xanagel GEL INTIMO Indicazioni Vaginosi, vaginiti aspecifiche, vulviti: grazie alla sua azione lubrificante, antisettica e lenitiva, risulta efficace nel controllo dei sintomi quali bruciore, prurito, secchezza vaginale e cattivi odori, ristabilendo il corretto trofismo dei tessuti vulvo-vaginali. Utile per lenire, per idratare e per lubrificare, riducendo i sintomi caratteristici. L'attività idratante e antiossidante restituisce la naturale idratazione e lubrificazione delle mucose genitali apprezzabile anche durante l'atto sessuale. Utile nel trattamento sintomatico delle radiodermiti. Migliora il trofismo delle mucose genitali nei trattamenti ormonali (pillola anticoncezionale, analoghi LH-RH). Nella donna in fase di perimenopausa, è di aiuto nel ripristinare il normale trofismo delle mucose

genitali; balaniti, balanopostiti: le azioni lubrificante, idratante e lenitiva concorrono al rapido ed efficace controllo dei sintomi quali bruciore, prurito, desquamazione che sono sintomi caratteristici degli stati infettivo-infiammatori del prepuzio e della mucosa del glande. Le attività lubrificante e idratante restituiscono il naturale trofismo dei tessuti. Nel paziente diabetico non sono rare le manifestazioni di flogosi delle mucose genitali; le attività svolte sono consentono di normalizzare l'ipereattività tissutale causa principale della flogosi e della sintomatologia caratteristica che ne deriva. Al fine di accelerare e favorire i processi di riparazione tissutale, è consigliato l'uso durante o dopo il trattamento con antibiotici o antimicotici prescritti dal medico. Modalità d'uso Applicazione intravaginale: svitare il tappo e avvitare una cannula al posto del tappo; estrarre lo stantuffo; comprimere progressivamente il tubo di Xanagel fino al riempimento della cannula; svitare la cannula ed introdurla in vagina delicatamente secondo fisiologia; premere delicatamente sullo stantuffo della cannula fino ad introdurne il contenuto nella cavità vaginale. Estrarre e smaltire la cannula che non dovrebbe più essere riutilizzata. Anche se il prodotto non cola all'esterno, è suggerita una applicazione serale prima di coricarsi. Vaginosi e vaginiti aspecifiche: una applicazione quotidiana, per 6-7 giorni, seguita da una applicazione/die a giorni alterni, per 6-7 giorni; vulviti: applicare 1-2 volte/die sulla mucosa vulvare una quantità di prodotto necessaria per l'estensione della sede dell'arrossamento e causa dei sintomi. Utilizzare il prodotto fino alla remissione dei sintomi; balaniti e balanopostiti: applicare sulla mucosa del glande un leggero strato di prodotto fino a coprire la mucosa nelle parti interessate. Ripetere l'applicazione due volte nell'arco della giornata. Utilizzare il prodotto fino alla remissione dei sintomi. Caratteristiche Dispositivo medico interamente formulato con componenti di origine naturale. La sua composizione integra in un unico prodotto la possibilità di impiego in tutti i casi di secchezza delle mucose genitali siano esse causate da infezioni (acute o ricorrenti) sia da modificazioni ormonali. La particolare formulazione del gel di Xanagel non unge, non produce particolari sensazioni di "caldo/freddo" e non lascia tracce sulla cute e sulla

mucosa. L'utilizzo di Xanagel può risultare utile sia per lenire che per idratare. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Formato 40 ml con 6 cannule.	Conservazione